

1907

Untersuchungen über die Funktion des Bogengangapparates bei Normalen und Taubstummen.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

gesamten Medizin

verfasst und einer

hohen medizinischen Fakultät

der

kgl. bayer. Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen

vorgelegt von

Wilhelm Brock

Assistent an der k. Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten
in Erlangen
aus Rappershausen (Unterfranken).

Tag der mündlichen Prüfung: 2. März 1907.

Erlangen.

K. B. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Junge & Sohn.

1907.



Gedruckt mit Genehmigung der hohen medizinischen Fakultät
zu Erlangen.

Referent: Herr Professor Dr. Denker.

Dekan: Herr Professor Dr. Hauser.

XXIII.

Aus der königlichen Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und
Kehlkopfkrankheiten in Erlangen (Professor Denker).

**Untersuchungen über die Funktion des Bogengangapparates
bei Normalen und Taubstummen.**

Von

Wilhelm Brock,
Assistent an der Klinik.

Am Schlusse seiner Abhandlung über „Das Hörvermögen der Taubstummen“, Wiesbaden 1897, gibt Bezold dem Wunsche Ausdruck, die bayr. Regierung, die so sehr bedacht sei auf das körperliche Wohl und die geistige Ausbildung der Taubstummen, möge ihr Interesse auch dem von ihm in der Münchner k. Zentral-Taubstummenanstalt probeweise eingeführten Unterricht der Taubstummen vom Ohr aus zuwenden. Dieser Wunsch sollte bald in Erfüllung gehen, denn am 6. Dezember 1896 wurde ein Regierungsbeschluß veröffentlicht, dessen Wortlaut ich wegen seiner Bedeutung für den Taubstummenunterricht nicht nur in Bayern, sondern auch im ganzen Reich nachstehend anführe:

1. Dem Antrag des Kgl. Universitätsprofessors Dr. Friedrich Bezold in München entsprechend wird genehmigt, daß

a. die in die Taubstummenanstalten neu eintretenden Zöglinge künftig alsbald nach dem Eintritte einer eingehenden Prüfung bezüglich der noch vorhandenen Hörfähigkeit unterzogen werden, daß

b. die in diesen Anstalten bereits vorhandenen Zöglinge, soweit sie noch Reste des Hörvermögens zeigen, in gleicher Weise näher geprüft werden, daß

c. bei allen Zöglingen die gefundenen Hör- und Sprachreste die geeignete Verwendung finden, indem sowohl den partiell hörenden als partiell sprechenden Zöglingen nach Tunlichkeit neben dem gemeinsamen Unterricht in besonderen Stunden ein eigener ihr Hör- und Sprechvermögen erhaltender und ausbildender Unterricht erteilt wird.

2. Diesen besonderen Hör- und Sprechunterricht sind die in der Schrift des k. Universitätsprofessors Dr. Bezold „Das Hörvermögen der Taubstummen“ (Wiesbaden, Verlag von Bergmann 1896) enthaltenen Normen und Weisungen zugrunde zu legen.

Als im September 1905 die neuerbaute mittelfränkische Kreis-Taubstummenanstalt zu Nürnberg eröffnet wurde, wurde mein hochverehrter Lehrer und Chef, Herr Professor Denker, als ärztlich technischer Berater des Inspektors dieser Anstalt in allen das Gehörorgan und die oberen Luftwege betreffenden Fragen ernannt und ich selbst als Assistent bei dieser Funktion angestellt.

Es war demnach unsere Aufgabe, an den Insassen der Nürnberger Anstalt diese Untersuchung vorzunehmen. Bei der Ausführung dieser Untersuchung wurde mir von Herrn Professor Denker die Anregung, die Zöglinge auch auf ihre Gleichgewichtsstörungen in Anlehnung an die Wannersche Arbeit „Über die Erscheinungen von Nystagmus bei Normalhörenden, Labyrinthlosen und Taubstummen“ genauer zu untersuchen. Die Resultate dieser Untersuchungen bilden den Inhalt folgender Arbeit und liefern zugleich einen kleinen Beitrag zur Lehre von der Funktion des Bogengangapparates bei Normalen und Taubstummen.

Die deutsche Literatur, die sich mit der Physiologie der Bogengänge beschäftigt, beginnt mit Autenrieth am Anfang des vorigen Jahrhunderts, der zu der Ansicht gelangte: „Die Bogengänge scheinen durch ihre Lage angewiesen zu sein, den Ort der Herkunft des Schalles zu bestimmen.“ Ein Teil der späteren Autoren schloß sich dieser Ansicht an, ein anderer Teil dagegen war anderer Meinung; so hält Stefani die halbkreisförmigen Kanäle für das Sinnesorgan der Richtung des Kopfes, eine Anschauung, die der jetzt so ziemlich allgemein geltenden schon näher kam. Wieder andere Forscher hielten die Bogengänge für ein rein akustisches Organ, ebenso wie die Schnecke. Helmholtz z. B. war längere Zeit dieser Anschauung; später freilich hat er seine Ansicht geändert und diese ist heute die von den meisten Physiologen und Otologen vertretene, nämlich daß das percipierende Organ für Töne und Geräusche einzig und allein die Schnecke ist.

Solange die Helmholtzsche Theorie nicht widerlegt und eine bessere an ihre Stelle gesetzt wird, die die Verhältnisse besser zu erklären vermag, sind wir wohl berechtigt, die Ansichten Helmholtz's nicht nur als Theorie, sondern als den Tatsachen entsprechende Wahrheit zu erachten. Diese Theorie erfuhr eine Stütze, als es nach Herstellung der Bezoldsehen kontinuierlichen Tonreihe gelang, das Hörvermögen vollständig

zu analysieren und nach einseitiger oder doppelseitiger Zerstörung der Schnecke mittels dieses Instrumentariums und des Galtonpfeifchens einseitige oder doppelseitige Taubheit mit absoluter Sicherheit festzustellen. Den vollständigen Beweis für die Richtigkeit der Helmholtzschen Theorie würden wir erbringen können, wenn es gelingen sollte, die Übereinstimmung der bei Taubstummen mit der kontinuierlichen Tonreihe gefundenen Hörreste mit entsprechenden Defekten in der Membrana basilaris bei der Sektion festzustellen.

Flourens war es, der zuerst die Funktion der Bogengänge richtig erfaßte.

Derselbe kam auf Grund seiner Experimente an Tieren (an Tauben und Kaninchen) zu der Anschauung, daß die Bogengänge dazu dienen, unsere Bewegungen in den drei Dimensionen des Raumes zu regulieren: horizontal, frontal und sagittal; er kam zu dieser Anschauung aus der Beobachtung, daß Verletzung eines Bogenganges bestimmte Bewegungsanomalien zur Folge hatte, die sich auf die Ebene des betreffenden Bogenganges lokalisierten. „Diese Bewegungen äußerten sich durch Pendelbewegungen des Kopfes, Verdrehung des Kopfes auf die operierte Seite und Umstürzen auf dieselbe, „Manègegang“ auf die verletzte Seite, ebenso auch beim Fliegen, Kreisbewegung auf dieselbe, oft aufgehobenes Flugvermögen, Unvermögen die Nahrung aufzunehmen, Rollungen um die Längsachse nach vorne und rückwärts, je nachdem die Durchschneidung den horizontalen, frontalen oder sagittalen halbzirkelförmigen Kanal betraf.

In Deutschland war Goltz der Forscher, der die Versuche Flourens', die im Laufe der Zeit fast der Vergessenheit anheim gefallen waren, wieder aufnahm.

Goltz hält auf Grund seiner Studien die Bogengänge für eine Vorrichtung, welche der Erhaltung des Gleichgewichts dient. Sie sind sozusagen Sinnesorgane für das Gleichgewicht des Kopfes und mittelbar des ganzen Körpers.

Auf alle die Arbeiten, welche jetzt folgten, welche die Funktion der Bogengänge immer mehr klärten, die Untersuchungsmethoden verbesserten, einzugehen, liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit. Wer sich für die Geschichte der Erforschung der Funktion der Bogengänge interessiert, den verweise ich auf die Wannersche Arbeit.

Breuers Ansicht, die jetzt fast allgemein angenommen ist,

geht dahin, daß wir im Vestibulum ein Sinnesorgan besitzen, welches durch den Bogengangapparat Drehungen, durch den Otolithenapparat progressive Bewegungen und die Lage des Kopfes im Raum zur Wahrnehmung bringt.

Nachdem die Funktion der halbzirkelförmigen Kanäle festgestellt war, war die Frage zu lösen: Welches ist der adäquate Reiz?

Als den Reiz auslösende Faktoren werden zurzeit von den meisten Autoren die Endolymphe und die Otolithen angenommen; beide aber nur im Zustande der Erregung. Die Eingriffe, die zur Erforschung dieser Frage vorgenommen wurden, waren verschiedene; alle verfolgten den Zweck, nach Reizung oder Zerstörung eines oder mehrerer Bogengänge die Reiz- oder Ausfallserscheinungen, die das betreffende Tier zeigte, zu erforschen.

Die Symptome, die das Versuchstier im allgemeinen nach Zerstörung des einen Bogengangapparates zeigt, sind im wesentlichen Gleichgewichtsstörungen: Pendelbewegungen des Kopfes in der Ebene des verletzten Bogengangs, Neigung zum Fallen auf die verletzte Seite, sowie Zwangsbewegungen (Manège-Roll-Zeigerbewegung) nach der operierten Seite, Überschlagen nach vorn und hinten, Augenablenkungen.

Außerdem beobachtete man noch eine eigentümliche Schwäche in den Extremitäten der operierten Seite.

Als sonstiges Symptom, das bei den Tierexperimenten noch auftrat, wurde noch gefunden und beschrieben der Nystagmus, der besonders für die späteren Untersuchungen wichtig wurde.

Beobachtet und beschrieben wurden ruckende Bewegungen der Augen oder Nystagmus von Kiesselbach, Sewall, Vulpian, Flourens, Bornhardt, Ewald, Cyon, Breuer; ebenso konnte Jansen bei einer Reihe von Fällen bei operativer Verletzung des Bogengangapparates heftigen Nystagmus beobachten.

Die Frage, wodurch die Endolymphe im Bogengangapparat den Reiz verursacht, auf welche Weise der Reiz zustande kommt, suchten verschiedene Hypothesen zu beantworten.

Goltz sucht in der Veränderung des Druckes der Flüssigkeitssäule das erregende Moment. „Wir wollen annehmen, daß die in der Ampulle vorhandenen Nervenendigungen in ähnlicher Weise geeignet sind, durch Druck erregt zu werden, wie etwa die dem Drucksinn dienenden Nerven der äußeren Haut. Die in den Bogengängen befindliche Flüssigkeit wird nach bekannten

physikalischen Gesetzen diejenigen Abschnitte der Wandung am stärksten anspannen, welche am meisten nach abwärts gelegen sind. Je nach der Stellung des Kopfes wird die Verteilung des Druckes der Flüssigkeit wechseln und einer jeden Kopfhaltung wird demgemäß immer eine bestimmte Form der Nervenerrregung entsprechen.“

Breuer bekämpft die Anschauung Goltzs'; er sucht das erregende Moment in der Bewegung der Endolympe.

Zu ähnlichen Anschauungen wie Breuer kam Mach; die hydrodynamische Theorie von Breuer und Mach, die jetzt fast allgemein Anerkennung gefunden hat, sagt aus, daß bei Beginn jeder Drehung des Kopfes wie auch bei Stillstehen desselben nach erfolgter Umdrehung das Trägheitsmoment der Endolympe eine relative Bewegung derselben erzeugt. Diese Bewegung muß notwendig eine Verbiegung der mit der Bogengangswand fest verbundenen Härchen der nervösen Endapparate in den Ampullen bewirken, wobei die drei nach den drei Dimensionen des Raums orientierten Bogengänge Empfindungen vermitteln müssen.

In seiner Arbeit „Untersuchungen über den vom Vestibularapparat des Ohres reflektorisch ausgelösten rhythmischen Nystagmus und seine Begleiterscheinungen gibt Barany die zurzeit herrschende Ansicht über die Physiologie des Bogengangapparates in folgender Weise wieder:

„Als physiologischer Reiz, der den Ohr-Nystagmus verursacht, sind nach der Theorie von Mach und Breuer, die heutzutage nahezu allgemein angenommen ist, die durch Stellungsänderung des Kopfes hervorgebrachte Endolymphbewegung resp. die durch diese Endolymphbewegung verursachte Verschiebung der Cupulae auf den Cristae ampullarum angesehen. Dauert eine Drehbewegung nur kurze Zeit, so werden beim Anhalten infolge der entgegengesetzten Endolymphbewegung die Cupulae wieder in ihre normale Lage zurückgebracht; dauert die Drehung längere Zeit, so werden die Cupulae allmählich durch die elastischen Kräfte der Epithelhaare in ihre Normallage zurückgezogen. Nystagmus während der Drehung besteht nur so lang, bis die Cupulae diese Normallage erreicht haben, dann verharren die Augen während der Drehung in Ruhe. Im Moment des Anhaltens aber tritt jetzt infolge der Trägheit der Endolympe die entgegengesetzte Endolymphbewegung und damit die entgegengesetzte Verlagerung der Cupulae ein und diese bewirkt den entgegengesetzt gerichteten Nachnystagmus.“

Barany spricht hier immer davon, daß beim Anhalten der Drehung in den Bogengängen eine entgegengesetzte Endolymphbewegung eintritt; von einer solchen entgegengesetzten Endolymphbewegung kann jedoch meines Erachtens nicht gesprochen werden, sondern die Endolymph wird sich gerade infolge ihrer Trägheit in der der Drehungsrichtung gleichen Richtung noch eine Zeitlang weiter bewegen.

„Wenn ein mit Flüssigkeit gefüllter Ring seine Drehung beginnt, so macht die Flüssigkeit eine relative rückläufige Bewegung. Dauert die Drehung an, so wird die lebendige Kraft dieser Strömung nach und nach durch die Reibung und Adhäsion an den Röhrenwänden aufgezehrt werden, natürlich um so rascher, je enger die Röhre ist, und die Flüssigkeit bewegt sich dann mit dem Ring im gleichen Sinne und gleicher Geschwindigkeit; das System ist dann in innerer Ruhe. Hält der Röhrenring nun plötzlich in seiner Drehung inne, so hat doch die Flüssigkeit die lebendige Kraft ihrer Bewegung; sie wird ihrem Beharrungsvermögen folgend, solange im Sinne der früheren Drehung des Ringes weiterströmen, bis auch die lebendige Kraft dieser nachläufigen Bewegung durch Adhäsion aufgezehrt ist.“

„Die Bewegung des Kopfes bewirkt ein Zurückbleiben der Endolymph in den Bogengängen, also entsprechende Verbiegung der nervösen Endorgane in den Ampullen, demnach eine Erregung der entsprechenden Nervenfasern und eine dem Bewußtsein nicht ganz unzugängliche reflektorische Erregung der entsprechenden Augenmuskeln.“ Die Untersuchungen Ewalds über die Wirkung künstlich erzeugter Bewegungen der Endolymph haben eine für alle bei Reizung der Bogengänge beobachteten Erscheinungen sehr wichtige Tatsache ergeben. War Ewalds pneumatischer Hammer am horizontalen linken Kanal angebracht, so erhielt er bei jeder Kompression des Kanals die eine Bewegung der Endolymph vom glatten Ende zur Ampulle erzeugte, eine langsame Kopf- und Augenbewegung nach rechts, beim Nachlaß der Kompression eine entgegengesetzte der entgegengesetzten Flüssigkeitsbewegung entsprechende langsame Kopf- und Augenbewegung nach links. Die letztere Kopf- und Augenbewegung war aber stets wesentlich schwächer als die bei Compression des Kanals. Es geht daraus hervor, daß die Endolymphbewegung im horizontalen linken Kanal vom glatten Ende zur Ampulle, wie sie auch bei der Drehung nach

der linken Seite auftritt, eine größere Wirksamkeit hat als die entgegengesetzte, vom Utriculus durch die Ampulle gegen das glatte Ende zu gerichtete.

Die Untersuchungen über die Wirkung der Endolymphbewegung, wie sie besonders von Högyes und Ewald angestellt wurden, haben zur Aufstellung folgender Sätze geführt.

Die Richtung der hervorgerufenen Augenbewegung ist abhängig: 1. von der Wahl des gereizten Bogenganges. 2. von der Richtung der Flüssigkeitsbewegung. Es ergab sich, daß die Bewegung der Flüssigkeit sowohl vom glatten Ende zur Ampulle zu als vom Utriculus durch die Ampulle zum glatten Ende konstante Augenbewegungen hervorruft. Bezüglich des horizontalen Bogenganges der Taube stellte Ewald fest: Bei Bewegung der Endolympe im rechten horizontalen Bogengange vom glatten Ende zur Ampulle erfolgt eine horizontale Bewegung beider Augen nach links, die umgekehrte Bewegung der Augen bei umgekehrter Bewegung der Endolympe. Lee, der seine Studien an Haifischen machte, bestätigte die Angaben Ewalds und konnte weiter feststellen, daß die Augenbewegungen bei Flüssigkeitsbewegung in jedem Kanal in einer, der durch den Kanal gelegten Ebene parallelen Ebene erfolgen, und zwar die langsame Bewegung des Nystagmus in derselben Richtung, in welcher die Flüssigkeitsverschiebung stattfindet.

Die Ergebnisse übertragen auf den Nystagmus nach Drehungen ergibt folgenden allgemein giltigen Satz:

„Die Augenbewegungen während der Drehung erfolgen an jedem Auge in einer auf die Drehungsachse des Kopfes senkrechten durch den Bulbus gelegten Ebene, die langsame Bewegung des Nystagmus entgegen der Drehungsrichtung.“

Zur Lösung der Frage, welche Strömung der Endolympe, ob beide, diejenige aus dem Utriculus durch die Ampulle zum glatten Ende des Bogenganges und die umgekehrte vom glatten Ende zur Ampulle Bewegungsvorstellung erzeugt, oder ob nur eine von diesen und welche von beiden wirksam ist, glaubte Wanner die einseitig Labyrinthlosen ganz besonders geeignet. Wanner untersuchte die Gleichgewichtsstörungen, insbesondere das Auftreten oder Fehlen des Nachnystagmus nach Drehen. Es standen ihm zu diesen Untersuchungen drei Fälle zur Verfügung, die ich hier anführen will.

1. Fall. F. Sch., 53 Jahre alt, rechtsseitige Labyrinthlosigkeit. Beim Drehen um die Vertikalachse ergibt sich:

Drehen von rechts nach links.
 Blick nach rechts: starker Nystagmus
 " geradeaus: kein "
 " nach links: " "
 Drehen von links nach rechts.
 Blick nach rechts: kein Nystagmus
 " geradeaus: " "
 " nach links: " "

2. Fall. I. St., 44 Jahre. Labyrinthlosigkeit links.

Beim Drehen um die Vertikalachse ergibt sich:

Drehen von rechts nach links.
 Blick nach rechts: kein Nystagmus
 geradeaus: " "
 " nach links: " "
 Drehen von links nach rechts.
 Blick nach rechts: kein Nystagmus
 " geradeaus: geringer "
 " nach links: kein "

Beim Drehen von rechts nach links zeigt sich bedeutend stärkeres Schwanken und heftigerer Schwindel als in der entgegengesetzten Richtung, in welcher die Pat. ohne besondere Mühe sich wie ein Kreisel dreht. Diese unerklärliche und auffällige Erscheinung, daß der subjektive Schwindel gerade nach der Seite eintritt, wo der Nystagmus fehlt, kehrt auch bei der nächsten Pat. wieder.

3. Fall. K. F., 33 Jahre, Labyrinthlosigkeit links.

Beim Drehen um die Vertikalachse ergibt sich:

Nach Drehen von rechts nach links.
 Blick nach rechts: kein Nystagmus
 " geradeaus: " "
 " nach links: geringer "
 Nach Drehen von links nach rechts.
 Blick nach rechts: kein Nystagmus
 " geradeaus: geringer "
 " nach links: starker "

Außerdem gibt Pat. an, beim Drehen von rechts nach links sehr häufig starken Schwindels zu haben, während dasselbe bei Drehen in entgegengesetzter Richtung vollständig fehlt, also das gleiche Phänomen wie im obigen Fall.

Wanner kommt auf Grund dieser Befunde zu dem Schluß, daß nach dem Drehen von der hörenden (gesunden) Seite zur labyrinthlosen der Nystagmus beim Blick nach allen Richtungen vollständig fehlt, während er nach dem Drehen von der labyrinthlosen zur hörenden Seite in der bei den Normalhörenden festgestellten Form auftritt. Des weiteren schließt Wanner daraus, daß nur die Bewegung der Endolymphe von Bogengang zur Ampulle Bewegungsvorstellung erzeugt.

Die Untersuchungen und Resultate Wanners, so einleuchtend sie auf den ersten Blick sind, erwiesen sich leider nicht als einwandfrei.

Eschweiler, Sasedateleff, Kümmel und Passow kamen bei ihren Untersuchungen zu anderen Resultaten; die genannten Autoren fanden nach Drehung bei einseitig Labyrinthlosen beiderseitigen Nystagmus.

Daß nicht allein die Endolymphbewegung vom Bogengang zur Ampulle, sondern auch die umgekehrte Bewegung Nystagmus erzeugt, hätte allein schon aus dem Auftreten des Nachnystagmus entnommen werden können.

In der neuesten Zeit hat uns Barany eine Methode angegeben, durch die man Nystagmus, Schwindel . . . kurz alle die Symptome, die die Drehung um die Vertikalachse erzeugt, und die man unter den Begriff Drehschwindel zusammenfaßt, hervorrufen kann.

Daß bei den Ohrenkranken infolge von Ausspülung des Gehörgangs oder der Paukenhöhle Schwindel, Uebelkeit entstehen kann, ist eine den Ohrenärzten längst bekannte Tatsache. Versuche, die darauf zurückgingen, hat Baginsky unternommen. Baginsky kam auf Grund seiner Versuche zu der Ansicht, daß der Nystagmus, den er beobachtete, nicht von den Bogengängen, sondern vom Gehirn ausgelöst werde.

Der erste aber, der systematische Untersuchungen mit Einspritzung von kaltem und warmem Wasser oder Flüssigkeit unter und über Körpertemperatur gemacht hat, ist Barany; er nennt den hierbei erzeugten (durch thermischen Reiz hervorgerufenen) Nystagmus kalorischen Nystagmus.

Die Ergebnisse der Untersuchungen Barany's seien hier kurz angeführt. Ausspritzung des rechten Ohres bei aufrechter Körperhaltung mit kaltem Wasser ergab einen nach links gerichteten vorwiegend rotatorischen, fast stets aber auch mit einer horizontalen Komponente gemischten Nystagmus, der bei Blick nach links am stärksten, bei Blick nach rechts am schwächsten ist.

Nimmt man zum Ausspritzen Wasser über Körpertemperatur, so tritt der entgegengesetzte Nystagmus auf; bei Ausspritzung des rechten Ohres ist der Nystagmus als vorwiegend rotatorisch nach rechts gerichtet und wird bei Blick nach rechts am deutlichsten. Nicht selten besteht neben der rotatorischen eine vertikale oder diagonale Komponente. Nimmt man Wasser von Körpertemperatur, so tritt bei noch so langem Ausspritzen und bei noch so empfindlichen Personen niemals Nystagmus oder Schwindel auf. Weiter fand B. bei seinen Versuchen eine ausgesprochene Abhängigkeit des kalorischen Nystagmus von der Kopfhaltung, im Gegensatz zu dem durch Drehen, Galvanisieren oder Druck hervorgerufenen.

Die Erklärung, die B. hierfür gibt, ist folgende: B. glaubt,

daß es sich um direkte partielle Abkühlung resp. Erwärmung des Labyrinthinhaltes und dadurch hervorgerufener Endolymphbewegung handelt. Durch diese Versuche und die bisher gefundenen Resultate ist nun endlich auch für den Menschen bewiesen, daß sowohl die Endolymphströmung vom glatten Ende zur Ampulle als auch die umgekehrte Bewegung Nystagmus erzeugt. Bei Anwendung dieser Methode ist es jetzt möglich, beide Labyrinthe getrennt auf ihre Funktion resp. auf ihr Nichtfunktionieren zu prüfen, während bei den Untersuchungen vermittels des Drehens das andere Labyrinth nicht auszuschließen war. In welcher Weise die beiden Labyrinthe nach Drehen erregt werden, ist in folgenden Sätzen formuliert.

1. Bei der Drehung nach links sowohl um die vertikale Achse (von oben gesehen entgegen dem Uhrzeiger, als auch um die sagittale Achse (gegen die Schulter links) und mithin auch um jede zwischen diesen Richtungen gelegene Achse wird das linke Labyrinth stärker erregt.

2. Dort wo sämtliche Nervenfasern einer Ampulle oder des gesamten Labyrinths gereizt werden, muß ein Nystagmus zustande kommen, wie er bei Drehung nach der Seite dieses Labyrinths auftritt.

Um mich in der Untersuchung zu üben, einen Blick für die verschiedenen Formen des Nystagmus zu gewinnen, und auch zur Vergleichung mit den Resultaten von Wanner und von Barany habe ich, bevor ich an die Untersuchung der Taubstummen ging, eine Anzahl Normalhörender nach Drehen auf den Nachnystagmus untersucht.

Der Gang der Untersuchung war folgender:

Objektive Untersuchung beider Gehörorgane, Prüfung der Hörweite für Zahlen in Flüstersprache, Feststellung der oberen und unteren Tongrenze, Rinnescher Versuch, Prüfung auf spontanen Nystagmus. Falls diese fünf Punkte den normalen Verhältnissen entsprachen, wurde das betr. Individuum als normalhörig betrachtet. Die Untersuchung des Nachnystagmus wurde ausgeführt nach den Vorschriften, wie sie Wanner gegeben hat:

10 maliges aktives Drehen um die Vertikalachse. Prüfung des Nachnystagmus, wobei der zu Untersuchende einen in ca. 30 cm Entfernung vom Auge vorgehaltenen Finger fixieren mußte. Es wurde untersucht beim Blick nach rechts, geradeaus und beim Blick nach links. Die ersten Normalhörigen, die ich in dieser Weise untersuchte, finden sich in der Tabelle nicht

angeführt. Der Grund, warum ich diese meine ersten Untersuchungen später nicht mehr verwenden konnte, war das Erscheinen der Arbeit Baranys. Da ich die früher untersuchten Normalen nicht mehr zur Prüfung des kalorischen Nystagmus bekommen konnte, so entschloß ich mich, andere Individuen zu finden, bei denen dann sowohl der Nystagmus nach Drehversuch als auch der kalorsiche Nystagmus geprüft wurde.

Bei der Kürze der Zeit war es mir nicht möglich, mehr als 20 Normalhörige in dieser Weise zu untersuchen.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen findet sich in Tabelle I S. 234/35). Wanner hat bei seinen Untersuchungen nur drei Grade der Intensität des Nystagmus unterschieden, starken Nystagmus, geringen Nystagmus und keinen Nystagmus. Ich konnte mich nicht entschließen, diese Einteilung anzunehmen; es waren die Unterschiede in der Stärke des Nystagmus doch zu groß, ich entschloß mich daher zu folgender Einteilung:

1. Kein Nystagmus
2. Einzelne Zuckungen
3. Geringer Nystagmus
4. Nystagmus
5. starker Nystagmus.

Die Untersuchung dieser 20 Normalhörigen mit 40 Gehörorganen ergab demnach:

Nystagmus nach Drehen von rechts nach links, bei Blick nach rechts:

Starker Nystagmus 10mal

Nystagmus 8mal

geringer Nystagmus 1mal

einzelne Zuckungen 1mal

kein Nystagmus kein mal

Beim Blick geradeaus und nach links war der Nystagmus schwächer oder gar nicht vorhanden.

Nystagmus nach Drehen von links nach rechts bei Blick nach links:

Starker Nystagmus 3mal

Nystagmus 12mal

geringer Nystagmus 5mal

einzelne Zuckungen 0mal

kein Nystagmus 0mal.

Beim Blick geradeaus oder nach links war der Nystagmus abgeschwächt oder überhaupt nicht vorhanden.

Umrechnung dieser Zahlen in Prozente, Vergleichung mit den von Wanner gefundenen Werten und Vergleichung der Stärke des Nystagmus je nach der Drehung beim Blick nach rechts, geradeaus und links ergibt folgende kleine Tabelle:

Drehen von rechts nach links.

Wanner: Starker Nystagmus beim Blick nach rechts 100 Proz.

Brock: " " " " " " 90 "

Wanner: Geringer und kein Nystagmus beim Blick geradeaus 92 Proz.

Brock: " " " " " " 55 "

Wanner: Kein Nystagmus beim Blick nach links 88 Proz.

Brock: " " " " " " 80 "

Drehen von links nach rechts.

Wanner: Starker Nystagmus beim Blick nach links 94 Proz.

Brock: " " " " " " 75 "

Wanner:	Geringer	und	kein	Nystagmus	beim	Blick	geradeaus	96	Proz.
Brock:	"	"	"	"	"	"	"	85	"
Wanner:	Kein	Nystagmus	beim	Blick	nach	rechts	100	Proz.	
Brock:	"	"	"	"	"	"	"	100	"

„Immer tritt also beim Normalhörigen Nystagmus in der der Drehungsrichtung entgegengesetzten Blickrichtung auf, während derselbe in der der Drehungsrichtung gleichgerichteten Blickrichtung fehlt.“ Ich glaube, eine kleine Einschränkung wird das Richtige treffen. Daß der Nystagmus in der der Drehungsrichtung gleichgerichteten Blickrichtung vollständig fehlt, ist nicht richtig; ich fand nach Drehen von rechts nach links bei Blick nach links:

1 mal Nystagmus,
3 mal geringen Nystagmus,
6 mal einzelne Zuckungen.

Die letzteren will ich, wie es Wanner auch tat, nicht als wirklichen Nystagmus bezeichnen, es fanden sich aber dann dennoch in 20 Proz. deutliche Augenbewegungen.

Die Blickrichtung ist also für den Nachnystagmus nach Drehversuch von wesentlicher Bedeutung.

„Besteht z. B. horizontaler Nystagmus nach rechts, wie er nach Drehen von rechts nach links auftritt, so ist derselbe bei Blick nach rechts, also beim Blick entgegen der Drehungsrichtung und in der Richtung seiner raschen Bewegung am stärksten, beim Blick geradeaus geringer und beim Blick nach links stark abgeschwächt oder aufgehoben. Fällt also die Richtung der langsamen Bewegung des Nystagmus mit der willkürlichen Blickrichtung zusammen, so hört der Nystagmus auf oder wird sehr stark abgeschwächt. Blick in der Richtung der raschen Bewegung verstärkt den Nystagmus, die umgekehrte Blickrichtung hebt ihn auf oder schwächt ihn ab.“ Aus den Versuchen von Lee an Haifischen wissen wir, daß die langsame Bewegung des Nystagmus in derselben Richtung stattfindet, in der sich die Endolympe in dem betreffenden Bogengang bewegt.

Beim plötzlichen Anhalten einer Drehung von rechts nach links wird sich im linken horizontalen Bogengang die Endolympe in der gleichen Richtung nach einiger Zeit fortbewegen; die Endolymphbewegung hat demnach die Richtung von rechts nach links. Nach den Gesetzen von Lee findet die langsame Bewegung des Nystagmus demnach nach links hin statt, die rasche nach rechts; ein Verhalten, wie wir es auch bei den Versuchen durch Drehen finden. Daß Fixation des Blickes

nach rechts Verstärkung des Nystagmus bedingt, ist nach obigem leicht zu verstehen und ebenso, daß bei Blickrichtung in der Richtung der langsamen Bewegung der Nystagmus fehlt.

„Willkürliche Fixation des Blickes, die die Augen in einer der langsamen Bewegung des Nystagmus entgegengesetzten Richtung festzuhalten versucht, ist nicht imstande, diese Bewegung aufzuhalten.“

Weitere Versuche, die Barany zu dieser Frage anstellte, führten ihn zu dem Ergebnis, daß man die Wirkung der labyrinthären Reize auf das Auge durch optische Reize vollständig aufheben, ja sogar in ihr Gegenteil verwandeln kann.

Bei Prüfung des kalorischen Nystagmus war es mir wegen Zeitmangels leider nicht möglich, den Nystagmus bei verschiedener Kopfhaltung zu untersuchen; ich mußte mich darauf beschränken, bei aufrechter Körper- und Kopfhaltung den durch Einspritzung von Wasser unter Körpertemperatur erzeugten Nystagmus zu untersuchen. Vor der Einspritzung des Wassers in den Gehörgang wurde noch einmal auf spontanem Nystagmus bei extremer Bulbusdrehung nach rechts, links nach oben und unten gefahndet; doch zeigte keiner der Normalhörigen spontanen Nystagmus.

Die Untersuchung wurde analog den Angaben B. ausgeführt.

Ein gerades Paukenröhrchen wurde unter Spiegelbeleuchtung bis dicht an das Trommelfell gebracht; auf ein Zeichen ließ eine Hilfsperson das Wasser aus einem etwa 1 l. haltenden Ballon, der durch einen längerem Schlauch mit dem Paukenröhrchen verbunden war, ohne Druck in das Ohr einfließen. Auf Nystagmus wurde geprüft analog der Prüfung nach dem Drehen beim Blick nach rechts, gerade aus und links unter Fixation des vorgehaltenen Fingers.

Die Untersuchungsresultate finden sich ebenfalls in Tabelle I (s. S. 236—237).

Immer wieder konnte ich konstatieren, daß der Nystagmus nach Drehen viel stärker war, als der kalorische Nystagmus; d. h. die einzelnen Ausschläge des Nystagmus nach Drehen waren viel größer als die des kalorischen Nystagmus; dagegen war der kalorische Nystagmus bedeutend länger zu beobachten als der durch Drehen erzeugte.

Ein Vergleich der Stärke des Nystagmus nach Drehen und des kalorischen Nystagmus ist deshalb unangebracht.

Auch hier habe ich die Einteilung in starken Nystagmus usw. beibehalten.

Nystagmus nach Einspritzen von Wasser von 28° u. darunter in den rechten Gehörgang bei Blick nach links. Nystagmus nach links.

Starken Nystagmus 1mal = 5 Proz.
Nystagmus 6mal = 30 Proz.
Geringen Nystagmus 13mal = 65 Proz.
Einzelne Zuckungen 0mal = 0 Proz.
Kein Nystagmus 0mal = 0 Proz.

Beim Blick nach rechts:

Starker Nystagmus 0mal = 0 Proz.
Nystagmus 0mal = 0 Proz.
Geringer Nystagmus 1mal = 5 Proz.
Einzelne Zuckungen 6mal = 30 Proz.
Kein Nystagmus 13mal = 65 Proz.

Nystagmus nach Einspritzung von Wasser von 28° C und darunter in das linke Ohr. Auftreten von Nystagmus nach rechts bei Blick nach rechts:

Starker Nystagmus 1mal = 5 Proz.
Nystagmus 8mal = 40 Proz.
Geringer Nystagmus 11mal = 55 Proz.
Einzelne Zuckungen 0mal = 0 Proz.
Kein Nystagmus 0mal = 0 Proz.

Beim Blick nach links:

Starker Nystagmus 0mal = 0 Proz.
Nystagmus 0mal = 0 Proz.
Geringer Nystagmus 0mal = 0 Proz.
Einzelne Zuckungen 3mal = 15 Proz.
Kein Nystagmus 17mal = 85 Proz.

Auch hier ist die Einwirkung der Blickrichtung auf den Nystagmus sehr deutlich. Beim Blick geradeaus ist der Unterschied nicht so auffallend. cfr. Tafel II.

Tabelle II.

Augenbewegungen nach Drehversuch und Ausspritzung der Ohren mit Wasser unter Körpertemperatur bei verschiedener Blickrichtung in absoluten und in Prozentzahlen.

Nystagmus nach Drehen von links nach rechts beim Blick nach

	1) in absoluten Zahlen			2) in Prozentzahlen		
	rechts	geradeaus	links	rechts	geradeaus	links
Kein Nystagmus	18	2		90 %	10 %	
Einzelne Zuckungen	2	6		10 %	30 %	
Geringer Nystagmus		9	5		45 %	25 %
Nystagmus		3	12		15 %	60 %
Starker Nystagmus			3			15 %

Fortsetzung S. 238.

Tabelle I. Erscheinungen von Nystagmus bei 20 Normalhörigen nach Dreh

Lfd. Nr.	N a m e	Alter	obere Ton- grenze	Nystagmus nach Drehen von			Schwindel	Nystagmus Drehen	
				links	nach	rechts		rechts	nach
				beim Blick naen				beim Blick	
				rechts	gerade aus	links		rechts	gerade aus
1	Dürr, Katharina	23	rechts 0.2 links 0.2	0	N	starker N	Schwindel	starker N	N
2	Gleißner, Therese	16	rechts 0.3 links 0.3	0	gering. N	N	Schwindel	starker N	N
3	Wildermann, Magdalena	21	rechts 0.2 links 0.2	0	N	starker N	starker Schwindel	gering. N	einz Zuck
4	Blum, Margarethe	16	rechts 0.3 links 0.3	einzel Zuck.	gering. N	N	Schwindel	N	N
5	Hofmann, Kaspar	27	recht 0 25 links 0.25	0	einzel Zuck.	N	geringer Schwindel	starker N	N
6	Schiener, Johann	19	rechts 0.3 links 0.3	0	gering. N	N	geringer Schwindel	N	gerin N
7	Böhner, Georg	19	rechts 0.3 links 0.2	0	0	N	kein Schwindel	N	einz Zuck
8	Gutweil, Johann	30	rechts 0.2 links 0.3	0	gering. N	N	geringer Schwindel	N	einz Zuck
9	Trapp, Johann	25	rechts 0.2 links 0.3	0	einzel Zuck.	gering. N	kein Schwindel	N	gerin N
10	Stahl, Caroline	20	rechts 0.2 links 0.2	0	0	gering. N	kein Schwindel	starker N	N
11	Sprattler, Wolfg.	18	rechts 0.3 links 0.2	0	gering. N	N	kein Schwindel	starker N	N
12	Schäfler, Kunig.	22	rechts 0.3 links 0.2	0	gering. N	N	starker Schwindel	N	gerin N
13	Sechser, Babette	19	rechts 0.2 links 0.2	0	gering. N	N	kein Schwindel	starker N	N
14	Sturm, Elise	20	rechts 0.2 links 0.3	0	gering. N	N	kein Schwindel	N	gerin N
15	Rahner, Babette	16	rechts 0.2 links 0.2	0	N	starker N	geringer Schwind	starker N	N
16	Stahl, Babette	24	rechts 0.2 links 0.25	0	einzel Zuck.	N	geringer Schwind.	starker N	N
17	Gentner, Johann	17	rechts 0.2 links 0.2	einzel Zuck.	gering N	N	kein Schwind.	starker N	gerin N
18	Frischholz, Joh.	33	rechts 0.2 links 0.2	0	einzel Zuck.	gering. N	geringer Schwind.	starker N	gerin N
19	Weiß, Paul	18	rechts 0.2 links 0.2	0	einzel Zuck.	gering. N	kein Schwind.	N	gerin N
20	Gleißner, Herm.	34	rechts 0.3 links 0.3	0	einzel Zuck.	gering. N	geringer Schwind.	gering. N	0

1) als nach Drehen von links nach rechts.

2) Nystagmus steht in ke

Spritzung von kaltem Wasser (Wasser unt. Körpertemperatur) in den Gehörgang.

kalorischer Nystagmus nach Einspritz. v. Wass. v. 28° C in d. rechte Ohr				Schwindel	kalorischer Nystagmus nach Einspritz. v. Wass. v. 28° C in d. linke Ohr				Schwindel
beim Blick nach			beim Blick nach						
rechts	gerade- aus	links	rechts		gerade- aus	links			
Wind.	0	gering. N	gering. N	Schwindelgefühl und Übelkeit	N	gering. N	einz. Zuck.	Schw.	
chw. 1	Zuck.	gering. N	starker N	stark. Schw.	starker N	gering. N	einz. Zuck.	stark. Schw.	
chw. 2	0	gering. N	gering. N	Schw., Übelkeit	gering. N	gering. N	0	Schw., Übelkeit	
Übelk. ürzen	einz. Zuck.	gering. N	N	Schw.	N	gering. N	0	Schw.	
chw.	gering. N	gering. N	gering. N	kein Schw.	gering. N	gering. N	0	kein Schw.	
chw.	0	gering. N	N	gering. Schw.	gering. N	0	0	kein Schw.	
chw.	0	einz. Zuck.	N	kein Schw.	N	gering. N	0	kein Schw.	
Wind.	einz. Zuck.	gering. N	gering. N	kein Schw.	gering. N	gering. N	0	kein Schw.	
chw.	einz. Zuck.	gering. N	N(Aus- schlag. s. gering	kein Schw.	N	gering. N	0	kein Schw.	
Schw. it	0	0	gering. N	kein Schw.	gering. N	0	0	kein Schw.	
d.	0	0	gering. N	kein Schw.	gering. N	0	0	kein Schw.	
elkeit	einz. Zuck.	gering. N	N(Aus- schlag gering)	gering. Schw.	gering. N	0	0	gering. Schw.	
chw.	0	0	gering. N	stark. Schw.	gering. N	gering. N	0	stark. Schw.	
chw.	0	gering. N	ger. N (Aus- schlag	kein Schw.	gering. N	gering. N	0	kein Schw.	
chw.	0	einz. Zuck.	gering. N	kein Schw.	gering. N	einz. Zuck.	0	kein Schw.	
Schw	0	einz. Zuck.	gering. N	gering. Schw.	N	gering. N	einz. Zuck.	Schw. u. Übelk.	
chw.	0	einz. Zuck.	gering. N	gering. Schw.	gering. N	einz. Zuck.	0	gering. Schw.	
chw.	einz. Zuck	gering. N	N	gering. Schw.	N	gering. N	0	kein Schw.	
chw.	0	einz. Zuck.	gering. N	gering. Schw.	N	gering. N	0	gering. Schw.	
Schw.	0	einz. Zuck.	gering. N	kein Schw.	N	gering. N	0	kein Schw.	

m Schwindel.

Nystagmus nach Drehen von rechts nach links beim Blick nach

	1) in absoluten Zahlen			2) in Prozentzahlen		
	rechts	geradeaus	links	rechts	geradeaus	links
Kein Nystagmus		1	10		5 %	50 %
Einzelne Zuckungen		3	6		15 %	30 %
Geringer Nystagmus	2	7	3	10 %	35 %	15 %
Nystagmus	8	9	1	40 %	45 %	5 %
Starker Nystagmus	10			50 %		

Nystagmus nach Ausspritzung des rechten Ohres beim Blick nach

	1) in absoluten Zahlen			2) in Prozentzahlen		
	rechts	geradeaus	links	rechts	geradeaus	links
Kein Nystagmus	13	3		65 %	15 %	
Einzelne Zuckungen	6	6		30 %	30 %	
Geringer Nystagmus	1	11	13	5 %	55 %	65 %
Nystagmus			6			30 %
Starker Nystagmus			1			5 %

Nystagmus nach Ausspritzung des linken Ohres beim Blick nach

	1) in absoluten Zahlen			2) in Prozentzahlen		
	rechts	geradeaus	links	rechts	geradeaus	links
Kein Nystagmus		4	17		20 %	85 %
Einzelne Zuckungen		2	3		10 %	15 %
Geringer Nystagmus	11	14		55 %	70 %	
Nystagmus	8			40 %		
Starker Nystagmus	1			5 %		

Was das Schwanken betrifft, so war dasselbe nach Drehen von rechts nach links und nach Drehen von links nach rechts immer vorhanden; dagegen durchaus nicht immer vorhanden war das subjektive Schwindelgefühl. Die Angaben der Untersuchten hierüber waren folgende:

Nach Drehen von rechts nach links:

Starker Schwindel 2mal = 10 Proz.

Schwindel 2mal = 10 Proz.

Geringer Schwindel 7mal = 35 Proz.

Kein Schwindel 9mal = 45 Proz.

Nach Drehen von links nach rechts:

Starker Schwindel 8mal = 40 Proz.

Schwindel 2mal = 10 Proz.

Geringer Schwindel 7mal = 35 Proz.

Kein Schwindel 3mal = 15 Proz.

Subjektives Schwindelgefühl nach Ausspritzung des rechten Ohres.

Starker Schwindel 2mal = 10 Proz.

Schwindel 3mal = 15 Proz.

Geringer Schwindel 6mal = 30 Proz.

Kein Schwindel 9mal = 45 Proz.

Subjektives Schwindelgefühl nach Ausspritzung des linken Ohres:

Starker Schwindel 2mal = 10 Proz.

Schwindel 4mal = 20 Proz.

Geringer Schwindel 3mal = 15 Proz.

Kein Schwindelgefühl 11mal = 55 Proz.

Brechreiz und Übelkeit trat auf nach Drehversuch 4mal und zwar nach Drehen von rechts nach links.

Nach Ausspritzung der Ohren trat ebenfalls 4mal Brechreiz und Übelkeit auf; 2mal nach Ausspritzung des rechten Ohres und ebenso 2mal nach Ausspritzung des linken Ohres.

Einige Male war starkes subjektives Schwindelgefühl vorhanden, ohne daß der objektive nachweisbare Nystagmus entsprochen hätte.

Auffallend ist das starke Überwiegen des starken Schwindelgefühls nach Drehen von links nach rechts gegenüber dem Drehen von rechts nach links. Nach diesem Befund wäre das rechte Ohr empfindlicher gewesen als das linke.

Bevor ich die Untersuchungsergebnisse mitteile, die ich bei den Zöglingen der Mittelfränkischen Kreistaubstummenanstalt bezüglich der Gleichgewichtsstörungen gefunden habe, muß ich auf die Verteilung der Hörreste bei den Taubstummen näher eingehen.

Bei Eröffnung der Anstalt im September 1905 befanden sich in derselben 48 Zöglinge; im Laufe des Jahres kamen noch 2 hinzu, sodaß im ganzen 50 Individuen zu Untersuchung kamen.

Von den Taubstummen, die jetzt Zöglinge der Anstalt sind, stammen ein großer Teil aus der jetzt nicht mehr bestehenden Nürnberger Taubstummen-Schule, einzelne kamen von anderen Schulen, 12 wurden in die erste Klasse der Schule aufgenommen.

Ein großer Teil der aus der Nürnberger Taubstummen-schule übernommenen Kinder war von dem verstorbenen Augen- und Ohrenarzt Hofrat Paul Schubert mit der kontinuierlichen Tonreihe nach Bezold schon untersucht; es waren dies im ganzen 24 Kinder.

Von diesen sind 6 in der Festschrift des Ärztlichen Vereins Nürnbergs bereits veröffentlicht. Ich habe diese 6 der Vollständigkeit halber nochmals in die Tabelle aufgenommen. Es blieben also mit der kontinuierlichen Tonreihe zu untersuchen

die 12 Zöglinge der ersten Klasse und 14 weitere Kinder, die sich auf verschiedene Klassen verteilten.

Von den 50 Taubstummen gehörten 17 dem weiblichen, 33 dem männlichen Geschlecht an; also ein starkes Überwiegen des männlichen Geschlechtes.

Die Untersuchung auf Hörreste wurde vorgenommen genau nach den Bezold'schen Vorschriften und Vorsichtsmaßregeln zum Teil von Herrn Professor Denker, zum Teil von mir unter Unterstützung des Lehrpersonals der Anstalt. Um gleich in medias res zu gehen, seien hier die zwei Haupttabellen (S. 242—259) eingefügt.

In der ersten finden sich Rubriken mit Namen, Alter, Eintritt in die Anstalt beziehungsweise Eintritt in eine andere Taubstummen-Schule, Ursache der Taubheit, objektiver Befund an den Gehörorganen, pathologischer Befund in den oberen Luftwegen, pathologischer Befund an den Augen. (Die Untersuchung der Augen wurde von dem Nürnberger Augenarzt Dr. Hubrich ausgeführt. Es sei ihm auch hier nochmals für das liebenswürdige Entgegenkommen der herzlichste Dank ausgesprochen), andere Erkrankungen und Angaben über Familienverhältnisse, körperliche Entwicklung, geistige Entwicklung und Bemerkungen.

In der anderen Haupttabelle, Rubriken mit Namen, Taubheit ob angeboren, erworben oder unsicher, Gruppe nach Bezold, Sprachgehör und die Untersuchungsergebnisse nach Drehen um die vertikale Achse.

Von den Schülern der ersten Klasse war Carl Ludwig Br. (laufende Nummer 11) die am Schluß des Schuljahres mit der kontinuierlichen Tonreihe auf ihre Hörreste untersucht wurden, nicht zu untersuchen.

Mit der Bezold'schen kontinuierlichen Tonreihe untersucht sind demnach nur 49 Kinder.

Diese 49 Kinder mit 98 Gehörorganen wurden eingeteilt bezüglich ihres Hörvermögens in

A. Totaltaube

1. Doppelseitig Taube
2. Einseitig Taube

B. Partiell-Taube.

Für die Abteilung B wurde die Bezold'sche Einteilung in sechs Gruppen angenommen.

Absolute Taubheit auf beiden Ohren zeigten von 49 Kindern 13 — 26,5 Proz.

Unter den bisher mit der kontinuierlichen Tonreihe untersuchten Taubstummen fanden:

Bezold 1893	unter 79 Zögl.	19,0 Proz.	doppelseit.	total taube
Bezold 1898	= 59	= 22,0	=	=
Barth	= 87	= 56,2	=	=
Schwendt u. Wagner	47	= 21,3	=	=
Denker	unter 63	= 39,7	=	=
Kickhefel	= 29	= 10,4	=	=
Haslauer	= 89	= 44,9	=	=
Schmigelow	= 184	= 28,0	=	=
Schubert	= 72	= 16,6	=	=
Wanner	= 108	= 23,1	=	=

Einseitig total taub wurden gefunden 10 Gehörorgane nämlich:
 Nr. 12 rechts, Nr. 17 rechts, Nr. 18 rechts, Nr. 26 links, Nr. 27
 rechts, Nr. 31 rechts, Nr. 34 links, Nr. 46 rechts, Nr. 49 rechts.

Totaltaube Gehörorgane demnach zusammen:

Doppelseitig totaltaube Gehörorgane 26

Einseitig = = 10

Summa 36 Gehörorgane=36,7 Proz.

Andere Autoren fanden folgende Zahlen:

Bezold 1893	30,4 Proz.
Bezold 1898	28,8 =
Barth	65,5 =
Schwendt u. Wagner	26,4 =
Denker	49 =
Kickhefel	17,2 =
Haslauer	54,5 =
Schmigelow	36,4 =
Schubert	15 =
Wanner	29,1 =

Die Verschiedenheit in der Häufigkeit der totalen Taubheit in den verschiedenen Anstalten ist nach Denkers Ansicht bedingt durch das Verhältnis der angeborenen und der erworbenen Taubheit.

B.

Partielltaube.

Die Gruppen habe ich abgegrenzt nach den Angaben, wie sie sich in Bezolds Arbeit, „Statistischer Bericht über die Untersuchungen an einer zweiten Serie von Taubstummen“ finden.

Nr.	Name	Daten		Ursache der Taubheit	Objektiver Befund an beiden Gehörorganen
		Tag der Geburt	Tag des Eintritts in die Anstalt		
1.	Ungerer, Konrad	13. Sept. 1898.	1. Januar 1906.	Im Alter von 2 Jahren durch Scharlach erworben.	rechts. Im Gehörgang des eiteriges Sekret. Sp. entleert macerierter Epid. u. käsige bröcklige Membran. Trommelfell bis an s. oberen Rand vollständig verflüssigt. Paukenhöhlenschleimhaut granulierend. links. Trfl. diffus getrübt. normaler Reflex fehlend.
2.	Waldrab, Elise	18. Juli 1898.	1. Sept. 1905.	Angeboren.	rechts Trfl. Hammergr. trahiert, normler Reflex. die Peripherie gerückt. links. Im Gehörgang eiteriges Sekret. Trfl. vor Epidermismembran nicht zu sehen.
3.	Zech, Georg,	10. Januar 1898.	1. Sept. 1905.	Ungewiß.	rechts. Trfl. normale Reflex abgetrübt. links. Reflex fehlend.
4.	Salfner, Georg	14. März 1897.	1. Sept. 1905.	Im 3. Lebensjahr Genickstarre	rechts Trfl. normaler Reflex verschwommen. links norm. Refl. vorhanden.
5.	Oettlein, Wolfgang	18. April 1896.	1. Sept. 1905.	Angeboren.	Trfl. bdrs. unverändert.
6.	Müller, Babette	7. Sept. 1899.	1. Sept. 1905.	Mit 2 Jahren angeblich durch Genickkrampf.	rechts. In der Tiefe des Gehörganges wenig riechendes Sekret. Trfl. vollständig fehlend. Protorialschleimhaut epidermoidal in der vorderen unteren Partie granulierend. links. Im Gehörgang rieches übelriechendes Sekret. Trfl. stark gerötet; in vorderen Partie Perforation.
7.	Lang, Eva	18. März 1893.	1. Sept. 1905.	Im 2. Lebensjahr infolge Ohrenflusses nach Keuchhusten entstanden.	rechts. Trfl. diffus getrübt. links. „ „ mit zellen dunkleren Flecken.

Pathologischer Befund in den oberen Schneidezähnen.	Pathologische Befunde an den Augen	Andere Erkrankungen und Angaben über Familienverhältnisse.	Körperliche Entwicklung	Geistige Entwicklung und Begabung	Bemerkungen
Deviatio, nach links, keine kariös.		war sonst immer gesund. Eltern sind gesund.	Größe: 1,13 cm. Kopfumfang: 47 1/2 cm. Leichte Hypertrophie der ganzen Schilddrüse.	Der Knabe ist bildungsfähig.	
se rechts. Inneres Ende mittleren Schmelzschleifwand aufliegend.	Blepharitis Conjunctivitis beiderseits, Maculae corneae.	Ohreiterung. Augenentzündung. Eltern sind gesund.	Größe: 1,14 1/2 cm. Kopfumfang: 50 cm. Schilddrüse: Mässige Vergrößerung d. Mittellappens.	normal	Etwas unsicherer stampfender Gang
ke adenoide Vegetationen, Peritonsillitis, keine kariös.		Als Kind rhach. Tante d. Mutter ist geist. schw. u. gestört; auch d. Onkel ist geist. schw. Eltern sind gesund.	Größe: 1,15, Kopfumfang: 48 cm.	gut.	Gang schleifend
ma. d. Nasen- u. d. Um- des l. Nasen- Adenoide Vegetationen.		Mit 3 Jahren Diphtherie. Eltern sind gesund.	Größe: 1,07, Kopfumfang 50 cm. leichte Kyph.	gut.	Gang wenig schleifend.
l. Hypertroph. d. Endes der ant. Schmelz. Adenoide Vegetation. Hypertroph. d. Gaumentonsillen. Zähne kariös.		War nie ernstl. krank. Eltern sind gesund.	Größe: 1,22, Kopfumfang: 52 cm.	normal	
ke Hypertrophie beider Gaumentonsillen, besonders rechts; Adenoide Vegetationen 8 Zähne kariös.		Sonst nie krank. Eltern sind gesund.	Größe: 1,05, Kopfumfang: 49 1/2 cm.	normal	Schleifender Gang
keine kariös.	Conjunctivitis bulbi.	Mit 1 1/2 Jahren Rotfriesel, mit 3 Jahren Masern. Eltern sind gesund.	Größe: 1,27, Kopfumf.: 49 cm. Schilddrüse. Ziemlich starke Hypertrophie beider Seitenlappen besonders links.	gering.	Schleifender Gang

Nr.	Name	Daten:		Ursache der Taubheit	Objektiver Befund an den Gehörorganen
		Tag der Geburt	Tag des Eintritts in die Anstalt		
8.	Held, Marg.	25. Januar 1899.	1. Sept. 1905.	Mit 1½ Jahren durch Konvulsionen entstanden.	Rechts Trommelfell getrübt; normaler Reflex schwommen. Links diffus getrübt.
9.	Fischer, Marie.	16. Sept. 1906.	1. Sept. 1905.	Angeboren.	Normal.
10.	Disterer, Michael.	15. Aug. 1898.	1. Sept. 1905.	Angeboren.	Rechts: Trommelfell diffus getrübt, links normaler Reflex abgerückt.
11.	Brunner, Karl Ludwig.	8. Sept. 1898.	1. Sept. 1905.	Angeboren.	Rechts normaler Reflex fehlend, links normaler Reflex nur angedeutet.
12.	Bast, Karl.	15. Okt. 1897.	1. Sept. 1905.	Angeboren.	Rechts im Gehörgang, selben vollständig ausgefüllt ein Wattepfropf, an dem er hängen haftet. Trommelfell. Größere Narbe in der vorderen Hälfte der Narbe abnorme Reflex. In d. unteren Hälfte keine Narbe mit abnormen Reflex.
13.	Daubinger, Marie.	1. Okt. 1894.	1. Sept. 1903.	Angeboren.	Rechts normal, links Reflex in der linken Trommelfellbrana Schrapnelli; normaler Reflex verkürzt.
14.	Eckstein, Hans.	25. Febr. 1894.	1. Sept. 1905.	Mit 6 Jahren durch Ohreiterung erworben.	Rechts im Gehörgang fettes Sekret. Später entleert bröcklige, klebrige Masse mit Eiter untermischte Masse. Große Perforation fast die ganze hintere Hälfte einnehmend, Promontorialschnecke nicht epidermisiert. In der Mitte Vergrößerung mit dem Promontorium verwachsen. Links im Gehörgang ebenfalls fettes Sekret. Große Perforation in der vorderen Hälfte.

Logischer Befund in den Luftwegen	Patholog. Befund an den Augen	Andere Erkran- kungen und Angaben über Familienver- hältnisse	Körperliche Entwicklung	Geistige Ent- wicklung und Begabung	Bemerkungen.
ang. granu- Tonsillitis rechts. kariös.	—	Mit 5 Jahren Lungenent- zündung.	Größe: 1,20 m, Kopfumfang: 49 ¹ / ₂ cm.	Sehr gut.	Gang wenig schleifend.
ang. granul., Tons. chron. kariös.	—	Immer gesund.	Größe: 1,22 m, Kopfumfang: 49 ³ / ₄ cm.	gut.	Geringe Hyper- trophie des Mittel- lappens und des Seitenlappens der Schilddrüse. Gang etwas schleifend.
Atrophie septi rechts, links trophie der Muschel anders nach zu. Ade- s Polster. kariös.	—	Immer gesund.	Größe: 1,11 m, Kopfumfang: 52 cm.	gering.	Leichte Hyper- trophie des rech- ten Seitenlappens. Gang: Fußstel- lung nach ein- wärts.
keine kariös.	—	Rachitis vom 1.—4. Jahr. Der älteste Bru- der (13 Jahre) auch taub- stumm.	Größe: 1,08 m, Kopfumfang: 53 cm, links starker Stirn- höcker.	norm.	Mittellappen der Schilddrüse etwas vergrößert.
keine adenoide tationen, Hy- pphie beider entonsillen.	—	In frühester Kindheit schwer krank.	Größe: 1,13 m, Kopfumfang: 49 ¹ / ₄ cm.	gut.	Gang schleifend.
schleimiges t, in beiden seiten. Pha- Tonsillitis 6 Zähne kariös.	—	Im 10. Lebens- jahre Masern u. Scharlach. Eltern sind Ge- schwisterkind.	Größe: 1,26 ¹ / ₄ m, Kopfumfang: 53 ³ / ₄ cm.	gut.	Schwerfälliger Gang.
Eingang der en Nasenseite rustationen. s Hypertro- der unteren nel, Rhinitis iderseits. olaris rechts en karies.	—	Seit frühester Kindheit rechts- seitige Ohreite- rung, mit 7 Jahren eiterige Fußgelenksent- zündung und Ohreiterung links. Mit 10 Jahren Ober- schenkelabszeß.	Größe: 1,39 m, Kopfumfang: 51 ³ / ₄ cm. Mäßig vor- springender rechter Pa- rietalhöcker.	gut.	—

Nr.	Name	Daten:		Ursache der Taubheit	Objektiver Befund an Gehörorganen
		Tag der Geburt	Tag des Eintritts in die Anstalt		
15.	Gebert, Heinrich.	14. Aug. 1898.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1902.)	Wahrscheinlich angeboren.	Rechts Reflex unterbrochen, links = normal.
16.	Graf, Johann.	13. Mai 1895.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1904.)	Im 2. Lebensjahre durch Krämpfe erworben.	—
17.	Hußlein, Johann.	19. April 1895.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1902.)	Angeboren.	Rechts normaler Reflex, links normaler Reflex, fehlend. Reflex in der linken Schrapnelli.
18.	Kenner, Frieda.	1. Sept. 1895.	1. Sept. 1905. (Anfang Mai 1903.)	Wohl in den ersten Lebensjahren durch Rachitis entstanden.	Rechts normaler Reflex, links Trübung im vorderen oberen Quadranten. Links normaler Reflex, links Trübung im hinteren unteren Quadranten.
19.	Seitz, Marie.	25. Jan. 1896.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1903.)	Mit 6 Jahren durch Mening. cerebrospin. erworben.	Rechts große Perforation, untere Hälfte des Trommelfells einnehmend. Harngefäße etwas injiziert, faserweiterungen auf Promontorium zu sehen. Links: Im hinteren und vorderen Quadranten mehrere nadelkopfgroße Perforationen, Verkalkung. Hintere
20.	Schröger, Elisabeth.	12. April 1896.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1902.)	Wohl angeboren.	Beiderseits starke Ektasienerscheinungen.
21.	Blödel, Marie.	29. Aug. 1896.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1902.)	Mit 2 1/2 Jahren durch Konvulsionen erworben.	Rechts Trommelfell flexibel, diffus getrübt. Links ebenfalls.
22.	Bock, Johann.	11. Febr. 1895.	1. Sept. 1905. (2. Sept. 1901.)	Im 2. Lebensjahre durch Gehirnentzündung erworben.	Trommelfell beiderseits flexibel.

Patholog. Befund an den Augen	Andere Erkrankungen und Angaben über Familienverhältnisse	Körperliche Entwicklung	Geistige Entwicklung und Begabung	Bemerkungen.
—	Nicht zu eruieren.	Größe: 1,34 m, Kopfumfang: 48 ³ / ₄ cm.	schlecht	Gang tappend.
—	Sonst immer gesund.	Größe: 1,29 m, Kopfumfang: 52 cm.	gut.	—
Ang. gran. karies.	Conj. bulbi beiders.	Masern mit 4 Jahren.	Größe: 1,31 m, Kopfumfang: 51 ¹ / ₂ cm.	gut. Maßige Verdickung d. Mittellappens. Gang schleifend.
Atrophie der Hornhaut, seitl. Adhäsion des Polster. Meidezähne stark gezackt.	Leichter Conus nach oben.	Englische Krankheit, hatte mit 4 Jahren mehrere Wochen lang tägl. epileptische Anfälle. Masern mit 5 Jahren.	Größe: 1,32 ¹ / ₂ m, Kopfumfang: 48 cm.	gering.
ts Schleimfrisch inj. ks ebenso, te Blutung den Gefäßen Knorpelsep. 4 Zähne bs. Maßige hypertrophie r Gaumenonsillen.	—	Masern mit 4 Jahren.	Größe: 1,27 m, Kopfumfang: 51 cm.	norm.
—	Zähne defekt	Mit 5 Wochen schwer krank gewesen; Brechdurchfall und Ohrenfluß auf einer Seite. Mit 2 Jahren Lungen- u. Rippenfellentzündung. Eine Schwester taubstumm.	Größe: 1,32 m, Kopfumfang: 51 cm.	schlecht
hoide Veget. grades; oper. II. 1903 von Schubert.	—	Sonst gesund.	Größe: 1,29 m, Kopfumfang: 51 ¹ / ₄ cm.	gut.
—	—	Masern und Lungenentzündung im ersten Lebensjahr.	Größe: 1,33 m, Kopfumfang: 54 cm.	Sehr gut.

Nr.	Name	Daten:		Ursache der Taubheit	Objektiver Befund an b Gehörorganen
		Tag der Geburt	Tag des Eintritts in die Anstalt		
23.	Gechter, Labette.	31. Jan. 1895.	1. Sept. 1905. (2. Sept. 1901.)	Mit 2 1/2 Jahren durch Scharlach erworben.	Trlf. beiderseits volls fehlend. Promontorialsch haut granulierend, in der wenig schleimiges Sekre
24.	Güntsch, Elise.	16. Juni 1896.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1903.)	Mit 1 Jahr durch Genickkrampf erworben.	Beiderseits Reflex verk
25.	Maul, Johann.	1. Juni 1895.	1. Sept. 1905. (2. Sept. 1901.)	Mit 2 Jahren durch Scharlach, Nierenentzündg. u. Gehirnhaut-entzündung er- worben.	Beiderseits Reflex verk
26.	Maar, Fritz.	24. April 1894.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1900.)	Wahrscheinlich angeboren.	In beiden Gehörgäng Cerumen.
27.	Pfanz, Frieda.	29. Mai 1893.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1899.)	Mit 4 Jahren durch Genick- krampf er- worben.	Rechts Verkalkung unter des Umbo. Links Einziehung, diff Trübung.
28.	Schlegel, Fritz.	6. Nov. 1895.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1902.)	Im 3. Lebens- jahr durch Hirnhaut- entzündung er- worben.	Beiderseits Verkalkung und unregelmäßige nar partielle Einziehunge
29.	Schlemmer, Bernhard.	17. März 1896.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1902.)	Scharlach und Diphtherie mit 2 1/2 Jahren.	Trommelfell beiderseits ständig fehlend. Prom rialschleimhaut granulier In der Tiefe eine mini Menge schleimigen Sekr
30.	Sonntag, Conrad.	27. Juli 1897.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1903.)	Mit 5 Jahren durch Meningitis cerebros spinalis erworben.	Rechts Trommelfell diffu trübt; normaler Reflex a rückt; links Trommelfell getrübt; normaler Re fehlend.

Pathologischer Befund in den Luftwegen	Patholog. Befund an den Augen	Andere Erkrankungen und Angaben über Familienverhältnisse	Körperliche Entwicklung	Geistige Entwicklung und Begabung	Bemerkungen
—	Strabismus convergens.	Großmutter des Mannes und der Frau waren Geschwister.	Größe 1,33 m. Kopfumfang 54 cm.	gut.	
—	—	Sonst immer gesund.	Größe 1,29 m. Kopfumfang 52 cm.	gut.	
—	—	Sonst gesund.	Größe 1,31 m. Kopfumfang 52 cm.	gut.	
—	—	Stimmritzenkrampf in den ersten Wochen.	Größe 1,37 1/2 m. Kopfumfang 52 1/2 cm.	gut.	
—	—	—	Größe 1,51 m. Kopfumfang 51 cm.	Ge- dächtnis- schw.	
—	Strabismus convergens alternans.	Masern und Mittelohrentzündung vorder Hirnhautentzündung.	Größe 1,30 m. Kopfumfang 51 cm.	gut.	
—	—	Masern und Mundfeile nach dem Scharlach.	schwächlich. Größe 1,26 m. Kopfumfang 50 cm.	normal	
—	—	Masern mit 5 Jahren.	Größe 1,27 m. Kopfumfang 50 1/2 cm.	normal	

Nr.	Name	Daten:		Ursache der Taubheit	Objektiver Befund an den Gehörorganen
		Tag der Geburt	Tag des Eintritts in die Anstalt		
31.	Zöller, Karl.	16. Sept. 1896.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1902).	Mit 1 1/2 Jahren durch Masern und Lungenentzündung.	Beiderseits Einziehungserscheinungen
32.	Baer, Johann	25. Juni 1894.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1902).	Angeboren.	Links Reflex verwischt
33.	Beringer, Georg.	19. Juni 1893.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1902).	Angeboren	Rechts Residuen, links Verkalkung im vord. ober Quadranten. Inj. der Hammergriffgefäße
34.	Braun, Andreas.	4. Juli 1893.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1901).	Mit 3 1/2 Jahren durch Gehirnhautentzündung erworben.	Beiderseits Reflex verkürzt punktförmig am Umbo
35.	Deml, Anna.	24. Okt. 1895.	1. Sept. 1905. (2. Sept. 1901).	Mit 1 1/2 Jahren durch Convulsionen erworben.	Rechts Reflex verkürzt, links patholog. Reflexe in d. Membr. Strapn.
36.	Fassold, Babette.	10. Sept. 1895.	1. Sept. 1905. (2. Sept. 1902.)	Wahrscheinlich angeboren.	Rechts große Verkalk. im ob. Quadranten; norm. R. fehlend. Links große Verkalkung fast die ganze hintere H. einnehmend. Promontorium schleimhaut epidermisirt
37.	Fechter, Johann.	22. Febr. 1895.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1903).	Durch Scharlach im 5. Lebensjahr schwerhörig.	Rechts im Gehörgang foetisches Sekret. In der mac. Epidermis. Links Gehörgang ebenfalls foetisch. Rechts, Perf. fast das ganze einnehmend. Links, Trf. auch hier bis an obere Peripherie vollständ. fehlend.
38.	Hartmann, Johann.	19. Aug. 1894.	1. Sept. 1905 (1. Sept. 1900.)	Angeboren.	Rechts Hammergriffgefäße etwas inj. normaler Reflex fehlend. Links Trf. leicht diffus getrübt.
39.	Himmelscher, Georg.	17. März 1893.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1902.)	Angeboren.	Trommelfell beiderseits reflexlos.
40.	Lieb, Gg. Leonhard	11. April 1895.	1. Sept. 1905. (2. Sept. 1902)	Kann nicht angegeben werden.	Rechts normaler Reflex verkürzt. Links Trommelfell reflexlos.

log. Befund den oberen Luftwegen	Pathol. Befund an den Augen	Andere Erkran- kungen und An- gaben über Familienvor- hältnisse	Körperliche Entwicklung	Geistige Ent- wicklung und Begabung	Bemerkungen
noide Vege- tionen middle- n Grades. Operiert am 29. September 1903.	—	Sonst gesund.	Grösse: 1,36 m. Kopfumfang: 54 cm.	gut	—
initis sicca anterior. Gang. chron.	—	Angeblich immer gesund.	Größe: 1,42 m. Kopfumfang: 52 cm.	gut	Leichte Hypertro- phie des rechten Seitenlappens der Schilddrüse.
evitatiosepti nach rechts, ke Hypertro- phie beider Mentononsillen des 3 Zähne.	—	In den ersten Jahren Rhachi- tis; Masern u. Steinblattern im 7. Lebensjahr.	Größe: 1,32 m. Kopfumfang: 51 cm.	gut	Leichte Ver- größerung der ganzen Schild- drüse.
noide Vege- tionen mittl. Grades. Operiert am 7. Juli 1903.	—	Sonst immer gesund.	Größe: 1,33 m. Kopfumfang: 54½ cm.	gut	Gang etw. plump, hart auftretend.
noide Vege- tionen. Operiert am 11. Juli 1903.	—	Sonst gesund.	Größe: 1,39 m. Kopfumfang: 53 cm.	gut	—
noide Vege- tionen mittl. Grades.	—	Ohreiterung. 2 ältere Ge- schwister taub- stumm.	Größe: 1,34 m. Kopfumfang: 50½ cm.	gut	Gang etw. träge.
inopharyng noides Polster. Hypertroph. Mentononsillen. des zahlreichen Zähne.	Rechts Macu- lae corneae. Conjunctivi- tis bulbi.	Sonst gesund.	Größe: 1,24 m. Kopfumfang: 52¾ cm.	gut	Leichte Hyper- trophie d. rechten Seitenlappens.
mittl. Muschel ders. d. Nasen- schleim. anlieg. Zähne kariös.	—	Masern mit 7 Jahren.	Größe: 34. Kopfumfang: 51½ cm.	gut	—
—	—	Immer gesund.	Größe: 1,45 m. Kopfumfang: 53 cm.	normal	—
—	—	Ohrenlaufen m. 2 Jahren; Lungenkatarrh m. 5 Jahren.	Größe 1,47 cm. Kopfform asymmetrisch, r. Scheitelbein	gut	—
höher und seine grösste Vorragung weiter nach vorn als am 1. Kopfumfang 52 cm.					

Nr.	Name	Daten:		Ursache der Taubheit.	Objektiver Befund an bei- Gehörorganen
		Tag der Geburt.	Tag des Eintritts in die Anstalt		
41.	Linz, Joh. Andreas	5. Juli 1894.	1. Sept. 1905. (2. Sept. 1902.)	Nach Anamnese i. d. ersten Jahren durch Rhachitis. Zur Zeit keine Zeichen der überstand. Rhachitis mehr zu konstat.	Rechts Reflex verkürzt.
42.	Merkel, Georg	27. Juni 1895.	1. Sept. 1905. (2. Sept. 1902.)	Mit 1½ Jahren durch Hirnhautentzündung erworben.	Rechts Trommelfell eingezogen.
43.	Ulrich, Andreas	12. Sept. 1892.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1900.)	Durch Scharlach erworben.	Beiderseits chronische Mitohreiterung.
44.	Zeh, Karl	11. Mai 1892.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1895).	Durch Genickkrampf mit ¾ Jahren erworben.	Trommelfell beiderseits leicht diffus getrübt.
45.	Brunner, Konrad	12. Juli 1892.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1899.)	Durch Hirnhautentzündung im 2. Lebensjahr erworben.	Beiderseits starke Einziehungserscheinungen.
46.	Schmittlein, Marie	24. Okt. 1892.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1899)	Durch Genickkrampf im 1. Jahr erworben.	Rechts Verkalkung im hinteren Quadranten; im hinteren Quadranten path. Reflex.
47.	Gruber, Theodor	23. Juni 1888.	1. Sept. 1905.	Im 15. Lebensjahr durch Mening. cerebrospinalis erworben.	—
48.	Forster, Johann.	14. März 1893.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1908.)	Mit 9 Jahren durch Sturz auf den Kopf erlangt	Beiderseits Trommelfell reflexlos.
49.	Hassler, Wilhelm.	21. Juni 1893.	1. Sept. 1905. (1. Sept. 1903.)	Mit 10 Jahren durch Mening. cerebrospin. erworben.	—
50.	Wunderle, Wilhelmine.	20. Okt. 1894	12. Mai 1906.	Allmählich zunehmende Schwerhörigkeit.	—

Patholog. Befund an den oberen Luftwegen.	Patholog. Befund an den Augen	Andere Erkran- kungen und An- gaben über Familienver- hältnisse.	Körperliche Entwicklung	Geistige Ent- wicklung und Begabung	Bemerkungen
—	—	Ohrenlaufen Masern mit 7 Jahren.	Grösse: 1,37. Kopfumfang: 51 cm.	gut schl. Wort- ge- dächtnis	—
enoide Vege- tionen. Oper. Juli 1903.	—	Klagt öfters über Ohren- schmerzen.	Grösse: 1,27. Kopfumfang: 51 cm.	Sehr gut	—
—	—	—	Grösse: 1,44 ¹ / ₂ Kopfumfang: 53 cm.	Schw.- sinnig	—
ertrophie der ilaren Muschel rechts	—	Lungenentzün- dung mit 1 ¹ / ₂ Jahr	Grösse: 1,65 Kopfumfang: 53 ³ / ₄ cm.	Schw. Bega- bung	—
ringeadoide vegetationen.	—	Vielfach Haut- ausschläge. Mit 8 Jahren Scharlach.	Grösse: 1,39. Kopfumfang: 53 cm.	gut	—
ichte Hyper- trophie beider Mentonsillen.	—	Mit 5 Jahren Masern.	Grösse: 1,45. Kopfumfang: 52 cm.	—	—
chts Cristasepti- lilag Pharyng. n. Stark. Late- strang links.	—	Kinderkrank- heiten.	Grösse: 1,64. Kopfumfang: 53 cm.	gut	Gang bei der Untersuchung normal, sonst etwas unsicher.
chts Cristasepti, links mässige ertrophie der ilaren Muschel pharyng. sicca n. Doppelbil- g des rechten ren Eckzahnnes.	—	Scharlach mit 5, Masern mit 7 Jahren.	Grösse: 1,52. Kopfumfang: 53 cm.	gut	—
ryng. granul. s. Hypertr. d. aten Tonsille. ries dentium.	—	—	Grösse: 1,42 ¹ / ₂ Kopfumfang: 54 cm.	gut	Mässige Hyper- trophie des Mit- tellappens der Schilddrüse.
ryng. granul enoide Vege- tationen.	—	Mutter in hohem Masse schwerhörig.	Grösse: 1,40 ¹ / ₂ Kopfumfang: 50 cm.	gut	Ist im Besitz der Sprache.

Nr.	Name	Taubheit				Ton- bereich	Gruppe nach Bezold	Sprachgehör	
		angeboren	erworben	unsicher	rechts links			Vokale	Konsonanten
1	Ungerer, Conrad		1		r l	C — 5,5 G H ¹ — 2,0 G	rechts VI links VI	alle alle	ptkrsssch ptkrsssch
2	Waldrab, Elise	1				tot. Taubh. beiderseits			
3	Zech, Georg			1	r l	a ¹ —c ² D—6,0 G	I VI	a i o u a i a u a i o u a u a i ou ü	p r ptkr l m n s sch
4	Salfner, Georg		1		r l	tot. Taubh. beiderseits			
5	Oettlein, Wolfg.	1			r l	D ² —5,5 G D ² —5,5 G	VI VI	alle alle	ptkr, die and. unsich. ebenso
6	Müller, Babette		1		r l	tot. Taubh. beiderseits			
7	Lang, Eva		1		r l	f — 5,9 G G — 10,3 G	VI VI	a i a i a u u ae i a i a u ü	ptkr p t
8	Held, Marg.		1		r l	tot. Taubh. beiderseits			
9	Fischer, Marie	1			r l	tot. Taubh. beiderseits			
10	Disterer, Mich.	1			r l	a ¹ —10,4 G e ¹ —10,4 G	V V	allgemein. Schallgeh.	
11	Brunner, Carl Ludw.	1			r l	Untersuch. unmöglich			
12	Bast, Carl	1			r l	— G—10,4 G	Taubheit VI	allgemeines Schallgehör	
13	Daubinger, Marie	1			r l	E ¹ —8,2 G D ¹ —4,5 G	VI VI	alle alle	k s sch tr sch
4	Eckstein, Hans		1		r l	— —	tot. Taubh. beiderseits		
15	Gebert, Heinrich	1			r l	— —	tot. Taubh. beiderseits		
16	Graf, Johann		1		r l	Fis—4,5 G A ¹ —4,6 G	VI VI	ae i o u a i a u eu ü ae i o u a i a u eu ü	ptksssch ptkr
17	Hußlein, Johann	1			r l	— e ² —gis 4 (20,0 G)	Taubheit I		

[illegible]

Nr.	Name	Taubheit				Ton- bereich	Gruppe nach Bezold	Sprachgehör	
		angeboren	erworben	unsicher	rechts links			Vokale	Konso- nanten
18	Kenner, Frieda		1?		r l	— H ² —6,4 G	Taubheit VI	— a e i o u au	—
19	Seitz, Marie		1			nichtsgehör	tot. Taubh.	— links	allgem. Ton
20	Schrögler, Elisabeth		1		r l	c ² —f ³ f ⁴ —d ⁵ a ¹ —8,0 G	rechts II links V	—	p
21	Blödel, Marie		1			— —	totale Taubheit	—	—
22	Bock, Johann		1		r l	e ² —d ⁴ E ² —11,6 G	r I l VI	ai u allgemeines Schallgehör	p r
23	Gechter, Babetta		1		r l	e ² —3,0 G e ² —e ³ a ³ —3,7 G	r V l II	— a u ai au	—
24	Guntsch, Elisa		1			tot. Taubh. beiders.	—	—	—
25	Maul, Joh.		1			tot. Taubh. beiders.	—	—	—
26	Maar, Fritz	1			r l	C—e ³ c ⁵ —9,0 G	II Taubheit	—	—
27	Pfanz, Frieda		1		r l	— F-c ² a ² -f ³ h ⁴ —9,5 G	Taubheit II	— u	— p l
28	Schlegel, Fritz		1		r l	tot. Taubh. beiders.	—	—	—
29	Schlemmer, Leonhard		1		r l	a ² —10,0 Galtongrenz. n. ganz sich. g ³ —fis ⁴	V I	—	—
30	Sonntag, Conrad		1		r l	g-d ⁵ (15,4 G) C ¹ —10,0 8,4—6,4 G	r. IV l. II	allg. Tongeh. alle Vokale	pkrs unsich. u. Konson.
31	Zöller, Carl		1		r l	— dis—fis ³	r. Taubheit l. III	—	— p
32	Baer, Joh.	1			r l	F—5,1 G A ¹ —4,3 G	r. VI l. VI	alle alle	p t k r s sch p t k r s sch
33	Behringer Georg	1			r l	D ¹ —5,3 G F—3,8 G	r. VI l. VI	alle alle	— alle
34	Braun, Willibald Andr.		1		r l	Fis—4,6 G —	r. VI l. Taubheit	a e i ai —	p r

Mus nach Drehen von nach rechts				Nystagmus nach Drehen von rechts nach links						Schwanken
Drehung nach	passive Drehung			aktive Drehung			passive Drehung			
	beim Blick nach			beim Blick nach			beim Blick nach			
	rechts	gerade- aus	links	rechts	gerade- aus	links	rechts	gerade- aus	links	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kein Schwanken
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kein Schwanken
N	Zuck	0	N	N	ger.N	0	N	ger.N	0	Schwanken
0	0	0	0	Z	0	0	Z	0	0	kein Schwanken
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kein Schwanken
N	N	N	N	N	ger.N	Z	N	ger.N	Z	Schwanken
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kein Schwanken
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kein Schwanken
N	0	ger.N	N	N	ger.N	0	N	ger.N	0	Schwanken
N	0	0	N	N	Z	0	N	Z	0	ger. Schwanken
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kein Schwanken
N	0	0	N	N	0	0	N	0	0	Schwanken
ger.N	0	0	ger.N	ger.N	0	0	ger.N	0	0	Schwanken
N	0	0	N	N	ger.N	0	N	ger.N	0	Schwanken
N	N	N	N	N	ger.N	ger.N	N	N	N	Schwanken
N	N	N	N	N	ger.N	0	N	ger.N	0	st. Schwanken
Zuck.	0	0	Z	Z	0	0	Z	0	0	ger. Schwanken

Nr.	Name	Taubheit				Ton- bereich	Gruppe nach Bezold	Sprachgehalt	
		angeboren	erworben	unsicher	rechts links			Vokale	Konsonanten
35	Deml, Anna		1		r. l.	C—15,0 G Fis—h ²	r. IV. l. III.	aeiouauai —	p r —
36	Fassold, Babetta	1?			r. l.	A ¹ —4,4 G A ² —5,8 G	r. VI. l. VI.	alle alle	p t k r p t k r s
37	Fechter, Johann		1		r. l.	H ¹ —1,5 G H ¹ —1,4 G	r. VI. l. VI.	alle alle	alle alle
38	Hartmann, Joh.	1			r. l.	D ¹ —h ² D ¹ —c ⁴	r. III. l. IV.	a aeiouau eu	p t k r l m n p t k r l m n
39	Himmelseher, Georg	1			r. l.	— A ² —g ⁴	r. Taubheit l. IV.	aeiouau eu	s s ch p t k r s s ch
40	Lieb, Georg Leonh.			1	r. l.	C ² —c ⁵ H—d ⁴	r. VI. l. IV.	allgemeines Schall	
41	Linz, Joh. Andr.			1	r. l.	e ² —10,4 G D ² —2,0 G	r. V. l. VI.	a u au a i u	p r s p t k r s s c
42	Merkel, Georg		1		r. l.	e ² -g ³ gis ⁴ -c ⁵ F ¹ —S,4G	r. II. l. VI.	allg. Schall- gehör a i o u	p p k r
43	Ulrich, Andr.		1		r. l.	H ¹ —1,0 G F ¹ —1,0 G	r. VI. l. VI.	a e i o u a e i o u	r t m r l
44	Zeh, Carl		1		r. l.	G—11,0 G e ² —9,9 G	r. VI. l. V.	a o u —	— —
45	Brunner, Conr.		1		r. l.	a ² —11,0 G e ² —11,0 G	r. V. l. V.	— —	p p
46	Schmittlein, Marie		1		r. l.	— g ² —8,5 G	r. Taubheit l. V	— —	— p r
47	Gruber, Theod.		1		r. l.	— —	tot. Taubh. beiders.	— —	— —
48	Forster, Johann		1		r. l.	h ² —dis ³ c—11,5 G	r. I. l. VI.	— —	— —
49	Hassler, Wilh.		1		r. l.	— a. h.	r. Taubheit l. I.	— —	— —
50	Wunderle	allmählich zunehmender Schwerhörigkeit			r. l.	c—6,0 G e—6,4 G	r. VI. l. VI.	alle Vokale =	alle bis au =

nach Drehen von nach rechts				Nystagmus nach Drehen von rechts nach links						Schwanken
passive Drehung				aktive Drehung			passive Drehung			
beim Blick nach				beim Blick nach			beim Blick nach			
nks	rechts	gerade- aus	links	rechts	gerade- aus	links	rechts	gerade- aus	links	
N	N	N	N	N	N	N	st N	N	N	Schwanken
N	0	ger.N	N	N	ger.N	0	N	ger.N	0	Schwanken
N	0	ger.N	N	N	ger.N	0	N	ger.N	0	Schwanken
N	0	ger.N	N	ger.N	0	0	ger.N	0	0	Schwanken
N	0	ger.N	N	N	ger.N	0	N	ger.N	0	ger. Schwanken
N	0	0	N	N	ger.N	0	N	ger.N	0	Schwanken
0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	kein Schwanken
0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	kein Schwanken
N	ger.N	ger.N	N	N	ger.N	0	N	ger.N	einzel. Zuck.	st. Schwanken
unsicher wegen spontanen Nystagmus										kein Schwanken
N	0	N	N	N	ger.N	0	N	ger.N	0	Schwanken
N	0	N	N	N	0	0	N	0	0	Schwanken
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kein Schwanken
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schwanken
Z	0	0	Z	0	0	0	0	0	0	kein Schwanken
N	0	ger.N	N	N	ger.N	e. Z	0	ger.N	0	Schwanken

Gruppe I.

Inseln. Hörstrecken bis zur Ausdehnung von drei Oktaven

Dieser Gruppe gehörten an 6 Gehörorgane, nämlich die Nummern 3 rechts, 17 links, 22 rechts, 29 links, 46 rechts, 49 links = 6,10 Proz.

Gruppe II

Lücken. Unterbrechungen innerhalb der Kontinuität einer Hörstrecke. Hierfür fanden sich ebenfalls 6 Gehörorgane = 6,10 Proz. Die Nr. 20 rechts, 23 links, 26 rechts, 27 links, 30 links, 42 rechts.

Gruppe III

Großer, bis zur dreigestrichenen Oktave (exklusive) herabreichender Defekt am oberen Ende, kleiner oder gar kein Defekt am unteren Ende der Skala.

Diese Gruppe umfaßt 3 Gehörorgane = 3,0 Proz.

Die Nrn. 31 links, 35 links, 38 links.

Gruppe IV

Kleiner bis Galton 12 reichender Defekt am oberen und großer bis kein Defekt am unteren Ende der Skala.

5 Gehörorgane = 5,1 Proz.

Die Nr. 30 rechts, 35 rechts, 38 links, 39 links, 40 links.

Gruppe V

Unwesentlicher oder kein Defekt am oberen Ende; großer von 4 und mehr Oktaven am unteren Ende der Skala.

10 Gehörorgane = 10,2 Proz.

Die Nrn. 10 rechts, links, 20 links, 23 rechts, 29 rechts, 41 rechts, 44 links, 45 rechts links, 46 links.

Gruppe VI

Unwesentlicher oder kein Defekt am oberen, von weniger als 4 Oktaven bis Null am unteren Ende der Skala = 32 Gehörorgane = 32,5 Proz.

Die Nrn. 1 rechts, links, 3 links, 5 rechts links, 7 rechts, links, 12 links, 13 rechts, links, 16 rechts, links, 18 links, 22 links, 37 rechts, links, 32 rechts, links, 33 rechts, links, 34 links, 44 rechts, rechts, 36 rechts, links, 40 rechts, 41 links, 42 links, 43 rechts, 48 links, 50 rechts links.

Von diesen 32 Gehörorganen, die sich auf 21 Individuen verteilen, gehören 2211 Individuen an, d. h. 22 Gehörorgane gehörten doppelseitig zu dieser Gruppe.

Auch hier stehen, was die Häufigkeit und Doppelseitigkeit anlangt, die Gruppe VI. des besthörenden und die Gruppe der Staltauben sich am nächsten.

Es sei mir gestattet, folgende Tabelle V hier einzufügen, die ich zum größten Teil der Schubertschen Arbeit entnommen habe zur Demonstration, wie sich die verschiedenen Gruppen bei den verschiedenen Autoren verteilen.

Tabelle V.

Untersucher:	Anzahl von untersuchten Ohren	Ohne Hörreste	Gruppe I	Gruppe II.	Gruppe III.	Gruppe IV.	Gruppe V	Gruppe VI.
	0/0							
Bezold 1893	158	8 = 30,4 %	28 = 17,7 %	20 = 12,7 %	1 = 0,6 %	9 = 5,1 %	18 = 11,4 %	33 = 20,9 %
Bezold 1898	118	34 = 28,8 %	18 = 15,3 %	7 = 5,9 %	5 = 4,2 %	7 = 5,9 %	10 = 8,5 %	37 = 31,4 %
Barth 1888	174	114 = 65,5 %	9 = 5,2 %	17 = 9,8 %	2 = 1,2 %	6 = 3,5 %	4 = 2,3 %	19 = 10,8 %
Schwendt und Wagner 1899	94	25 = 26,6 %	28 = 30 %	5 = 5,3 %	0 = 0	2 = 2,1 %	5 = 5,3 %	27 = 29,9 %
Kickhefel 1899	58	10 = 17,2 %	3 = 5,2 %	13 = 22,4 %	0 = 0	12 = 20,7 %	2 = 3,4 %	18 = 31,1 %
Denker 1900	126	62 = 49,2 %	31 = 24,6 %	7 = 5,6 %	4 = 3,2 %	4 = 3,2 %	3 = 2,4 %	15 = 12 %
Schmiglow 1901	368	134 = 36,4 %	46 = 12,5 %	63 = 17,1 %	5 = 1,4 %	32 = 8,7 %	16 = 4,4 %	72 = 19,6 %
Haßlauer 1901	178	97 = 54,5 %	19 = 10,7 %	11 = 6,2 %	1 = 0,6 %	5 = 2,8 %	18 = 10,1 %	27 = 15,2 %
Schubert 1901	144	36 = 25 %	13 = 9 %	18 = 12,5 %	1 = 0,7 %	13 = 9,1 %	14 = 9,7 %	49 = 34 %
Wanner 1901	216	62 = 29,1 %	30 = 13,9 %	14 = 6,5 %	7 = 3,3 %	15 = 6,9 %	22 = 10,2 %	65 = 30,1 %

In der Aufnahme und Voraussetzung, daß bei den Taubstummten nicht allein die Schnecke, sondern auch der Bogengangapparat zum Teil oder gänzlich zerstört sei, hat man schon frühzeitig angefangen, die Taubstummten auf Gleichgewichtsstörungen zu untersuchen.

Die ersten derartigen Untersuchungen leiden darunter, daß damals noch nicht möglich war, die Schnecke vollständig zu analysieren; erst seit wir imstande sind, selbst die kleinsten

Hörreste festzustellen, sind wir auch in der Lage, sicher absolute Taubheit zu diagnosticieren. Der erste, der Taubstummen auf Gleichgewichtsstörungen hin untersuchte, war James, der 519 Taubstumme durch Rotation auf Schwindel untersuchte, 186 davon = 35,8 Proz. konnten nicht schwindlich gemacht werden.

134 = 25,8 Proz. zeigten leichten Schwindel,

199 = 38,4 Proz. zeigten gewöhnlichen, ja stärkeren Schwindel als Normalhörende. Von 200 Normalen dagegen blieb nur einer schwindelfrei.

Als 2. untersuchte Kreidl Taubstumme in der Absicht, an ihnen die Hypothese von Mach und Breuer auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

Kreidl erkannte hierbei, daß die Augenbewegungen, die einer streng objektiven Untersuchung zugänglich sind, ein wertvolles Reagenz abgeben können.

Kreidl konnte nach Abschluß seiner Untersuchungen folgende Sätze aufstellen:

Erstens ist damit am Menschen der Beweis geliefert, daß die Augenbewegungen, die wir kompensatorisch bei Drehung des Kopfes und des Körpers ausführen, tatsächlich reflektorisch durch die Bogengänge ausgelöst werden und daß zweitens die Bogengänge wirklich das Perzeptionsorgan für die Drehungen des Kopfes und Körpers sind.

Kreidl setzte die Taubstummen auf einem hierfür konstruierten Drehbrett der Rotation aus und prüfte die Augenbewegungen während der Drehung durch Auflegen der Finger auf den durch das geschlossene Oberlid geschützten Bulbus; er fand hierbei bei 109 Taubstummen

31 mal normale,

10 mal subnormale und geringe,

55 mal keine Augenbewegungen.

(Schluß folgt.)

II.

Aus der königlichen Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und
Kehlkopfkrankheiten in Erlangen (Professor Denker).

Untersuchungen über die Funktion des Bogengangapparates bei Normalen und Taubstummen.

Von

Dr. Wilhelm Brock,
Assistent an der Klinik.

(Fortsetzung und Schluß.)

Hitzig, Kny und Breuer waren die ersten, die beim Menschen den sogenannten galvanischen Nystagmus näher untersuchten; auf die Untersuchungen Kiesselbachs und die anderen noch in Betracht kommenden Autoren einzugehen, liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit.

Als konstante Symptome des galvanischen Schwindels beim Menschen wurden dabei gefunden.

1. Schwanken des Kopfes beim Öffnen und Schließen des Stromes,
2. Das Auftreten nystagmusartiger Augenbewegungen während der Durchströmung.

Breuer kommt am Schluß seiner Arbeit zu der Überzeugung, daß die Erscheinungen des galvanischen Schwindels unter Verhältnissen erscheinen, welche die Beteiligung von Stromschleifen ins Gehirn ausschließen lassen. Der galvanische Schwindel entsteht hauptsächlich durch Reizung des Vestibularapparates, wie das galvanische Phosphen durch Reizung der Retina.

Pollak war es, der diese Art der Untersuchung auch zur Taubstummenuntersuchung verwendete.

Zur Untersuchung in dieser Weise kamen 82 Taubstumme. von denen 64 von Kreidl bereits auf dem Drehbrett untersucht waren.

Die Pollakschen Resultate sind folgende:

Normale Kopfbewegungen	50 = 61	Proz.
Fragliche oder unregelmäßige	5 = 6	Proz.
Keine Kopfbewegungen	27 = 33	Proz.
Normale Augenbewegungen	53 = 64,6	Proz.
Fragliche oder schwache	4 = 4,9	Proz.
Keine Augenbewegungen	24 = 29,3	Proz.
Weder Kopf- noch Augenbew. hatten	25 = 30,6	Proz.

Berücksichtigung der von Kreidl vorher untersuchten 64 Taubstummen.

Es hatten	a) Kopfbewegungen	
Normale	36 = 56,2	Proz.
Zweifelhafte	5 = 7,8	Proz.
Keine	23 = 36	Proz.

b) Augenbewegungen.

Normale	38 = 59,4	Proz.
Zweifelhafte	4 = 6,2	Proz.
Keine	22 = 34,4	Proz.
Weder Kopf- noch Augenbew. hatten	21 = 32,8	Proz.
Normal verhielten sich	31 = 48,5	Proz.

Strehl, der ebenfalls Untersuchungen mit galvanischem Schwindel machte, fand von diesen ziemlich abweichende Resultate. Dieser Autor kommt daher zu der Überzeugung, daß der sogenannte statische Sinn des Labyrinths beim Menschen eine äußerst geringe Bedeutung habe.

Zu einer ähnlichen Anschauung kam Bruck.

Bezold setzte die Untersuchungen auf Gleichgewichtssuchungen fort; er bediente sich 1893 des Kreidlschen Drehbretts, um das Vorhandensein oder Fehlen der beim Drehen in der Norm sich einstellenden rhythmischen Augenbewegungen zu kontrollieren und kam dabei zu folgenden Resultaten.

Die Schwindelercheinungen wurden geprüft nach aktivem Drehen um die Vertikalachse.

Die Resultate dieser Untersuchungen seien hier angeführt.

Gar kein Schwanken zeigten	30 oder 38,0 Proz.
Geringes Schwanken „	16 „ 20,3 Proz.
Starkes Schwanken „	32 „ 40,5 Proz.

Bei Vergleichung der einzelnen Gruppen untereinander in Beziehung der Stärke des Schwankens fand Bezold, daß sich die unter den Taubstummen am zahlreichsten vertretenen Gruppen, die absolut Tauben und die Gruppe VI, d. h. die Taubstummen mit den geringsten Hördefekten sich geradezu entgegengesetzt verhalten.

Unter den absolut Tauben zeigten nämlich nicht weniger als 54,2 Proz. gar kein Schwanken und nur 20,8 Proz. stärkeres Schwanken.

In der Gruppe VI dagegen fanden sich nur 12,1 Proz. welche kein Schwanken zeigten, während bei 66,7 Proz. ein starkes der Norm entsprechendes Schwanken sich einstellte.

Zwischen diesen beiden extrem von einander abweichenden Gruppen im ganzen mitten inne stehen die übrigen Gruppen:

Bezüglich der Augenbewegungen kam Bezold zu folgenden Zahlen:

Gar keine Augenbewegungen zeigten	
im ganzen	11 = 13,9 Proz.
nur einzelne	22 = 27,8 Proz.
Subnormale	18 = 22,8 Proz.
Normale	14 = 17,7 Proz.

Obwohl Bezold nur 65 Individuen auf ihre Augenbewegungen hin untersuchte, hat er die Prozente doch auf die Gesamtzahl der 79 Taubstummen berechnet; die Zahlen sind daher alle zu klein. Die Prozente auf die untersuchten 65 berechnet geben folgende Zahlen:

gar keine Augenbewegungen	11 oder 16,9 Proz.
nur einzelne	22 „ 33,8 Proz.
Subnormale	18 „ 27,7 Proz.
Normale	14 „ 21,6 Proz.

So oft die Bezold'schen Zahlen angeführt werden, habe ich hinter die Bezold'schen Zahlen die auf 65 Gesunde berechneten Prozentzahlen gesetzt.

Wenn wir die einzelnen Hörgruppen miteinander vergleichen, so treten uns ebenso, wie wir dies beim Schwanken nach dem willkürlichen Drehen gefunden haben, auch hier wieder die größten Kontraste entgegen zwischen den absolut Tauben und der Gruppe VI, oder den am besten Hörenden.

Unter den absolut Tauben zeigten:

Keine Augenbewegungen	25,0	(29,2 Proz.)
Nur einzelne	33,3	(39,2 Proz.)
zusammen:	58,3	(68,4 Proz.)
Subnormale Augenbewegungen	20,8	(24,3 Proz.)
Normale	6,3	(7,3 Proz.)
zusammen:	27,1	(31,6 Proz.)

In der Gruppe VI dagegen zeigten:

Keine Augenbewegungen	6,1	(7,4 Proz.)
Nur einzelne	15,2	(18,5 Proz.)
zusammen:	21,3	(25,9 Proz.)
Subnormale Augenbewegungen	18,9	(22,2 Proz.)
Normale	42,4	(51,3 Proz.)
zusammen:	61,3	(74,1 Proz.)

Die übrigen Gruppen nehmen eine Mittelstellung ein, neigen bald mehr zu den Totaltauben, bald mehr zur Gruppe VI der Besthörenden.

Bezold findet demnach unter den totaltauben Kindern ein bedeutendes Überwiegen der Drehversager, unter den mit guten Hörresten ausgestatteten Kindern ein noch bedeutenderes Überwiegen der normal Reagierenden.

Durch die 2. Untersuchungsreihe wurden diese Befunde bestätigt.

Bei dieser 2. Untersuchungsreihe, bei welcher das Schwanken und der Nystagmus nach aktivem Drehen geprüft wurden, finden wir folgende Notizen:

Kein Schwanken zeigten	47,5 Proz.
Geringes	23,7 Proz.
Starkes	28,8 Proz.

Für das Auftreten und Fehlen des Nystagmus fand Bezold folgende Zahlen:

Keinen Nystagmus zeigten	28,8 Proz.
Geringen „ „	28,8 Proz.
Starken „ „	42,4 Proz.

Auch hier tritt der Kontrast zwischen den Totaltauben und Gruppe VI deutlich hervor.

Von den Totaltauben zeigten 85,3 Proz. kein Schwanken während dasselbe bei Gruppe VI nur in 21,6 Proz. ausfiel.

	Totaltaube	Gruppe VI.
Keinen Nystagmus zeigten	55,9 Proz.	2,7 Proz.
Starken Nystagmus zeigten	11,8 Proz.	67,6 Proz.

Eine Anzahl Autoren, die sich auch mit der Untersuchung von Taubstummen beschäftigte, unterließ die Prüfung auf Gleichgewichtsstörungen.

Denker, Haslauer, Wanner, Hugo Frey und Hammerschlag nahmen diese Untersuchungen wieder auf und kamen zu folgenden Resultaten.

Denker, der die Insassen der Taubstummenanstalt zu Soest auf ihre Hörreste hin untersuchte, benützte zur Untersuchung der Gleichgewichtsstörungen zuerst die Kreidl'sche Methode; wegen eigenen subjektiven Schwindels beschränkte er sich später auf die Untersuchung des Nachnystagmus.

Von 63 Taubstummen zeigten:

Starkes Schwanken	19 = 28,5 Proz.
Geringes Schwanken	20 = 31,9 Proz.
Kein Schwanken	25 = 39,6 Proz.
Keine Augenbewegungen zeigten:	35 = 41,7 Proz.
Einzelne „ „	11 = 18,3 Proz.
Subnormale „ „	10 = 16,7 Proz.
Normale „ „	14 = 23,3 Proz.

Haslauer, der die Taubstummen der Würzburger Anstalt untersuchte, fand folgende Zahlen:

Von 176 Gehörorganen zeigten:

Starken Nystagmus	40 = 22,8 Proz.
Geringen Nystagmus	49 = 27,8 Proz.
Keinen Nystagmus	87 = 49,4 Proz.

Wanner untersuchte 108 Taubstumme; von denen zeigten

Kein Schwanken	47,2 Proz.
Geringes „	15,9 Proz.
Starkes „	16,9 Proz.

Keinen Nystagmus ohne Rücksicht auf die Drehungsrichtung zeigten 37 = 34,7 Proz.

Geringen Nystagmus ohne Rücksicht auf die Drehungsrichtung zeigten 18 = 16,6 Proz.

Starken Nystagmus ohne Rücksicht auf die Drehungsrichtung zeigten 53 = 48,7 Proz.

Nager, der keine tabellarische Übersicht gibt, kommt zu ähnlichen Resultaten. Die ziffermäßige Zusammenfassung der Versuchsergebnisse von Frey und Hammerschlag ergab folgendes Resultat.

Von 93 Untersuchten reagierten 46 = 49,5 Proz. positiv
 42 = 45,2 „ negativ
 5 = 5,3 „ fraglich

Zur besseren Übersicht sei Tabelle VI eingefügt, die zum größten Teil aus der Arbeit von Frey und Hammerschlag entnommen ist.

Tabelle VI.

Versuchsergebnisse	I. Bezold 1893 %	II. Bezold 1898 %	III. Denker %	IV. Hass- lauer %	v. Wanner %	VI. Frey u. Hammer- schlag %	VII. Brock %
Normale Augenbewegungen I. III.							
Subnormale Augenbewegungen I. III.	49,3	42,4	40,0	22,8	48,7	49,5	57,2
Starker Nystagmus II. IV. V. VII.							
Nystagmus VII.							
Positive Reaktion VI.							
Vereinzelte Bewegungen I. III.							2,0 6,1
Geringer Nystagmus II. IV. V. VII.	33,8	28,8	18,3	27,8	16,6	5,3	8,1
Fragliche Reaktion VI. Unsicherer (fraglicher) Nystagmus VII.							
Keine Augenbewegungen I. III.							
Kein Nystagmus, Fehlen des Nystagmus II. IV. V. VII.	16,9	28,8	41,7	49,4	34,7	45,2	34,7
Negative Reaktion VI.							
Einzelne Zuckungen VII.							

Tabelle VII.

Gleichgewichtsstörungen und Nystagmus bei den untersuchten 49 Taubstummten nach Drehversuch ohne Rücksicht auf die Drehungsrichtung in absoluten und Prozentzahlen.

Summe der Gehörorgane	Absolute Taubheit	Gruppe I	Gruppe II	Gruppe III	Gruppe IV	Gruppe V	Gruppe VI	Gesamtzahl der Gehörorg.	Indiv.
	36	6	6	3	5	10	32	98	
Gleichgewichtsstörung nach Drehen um die Vertikalachse ohne Rücksicht auf die Drehungsrichtung	Kein Schwanken	23=63,9%	3=80%	1=16,7%	—	2=20%	5=15,6%	34=34,7%	17
	Geringes Schwanken	6=16,7%	—	1=16,7%	1=20%	—	2=6,20%	10=10,2%	5
	Schwanken	6=16,7%	2=33,3%	4=66,6%	4=80%	8=80%	16=50%	42=42,8%	21
	Starkes Schwanken	—	1=16,7%	—	—	—	9=28,2%	10=10,2%	5
Nystagmus nach Drehversuch ohne Rücksicht auf die Drehungsrichtung	Unsicher	1=2,8%	—	—	1=33,3%	—	—	2=2,1%	1
	Kein Nystagmus	21=58,3%	4=66,7%	1=16,7%	—	—	4=12,5%	30=30,6%	15
	Einzelne Zuckungen	3=8,3%	—	—	—	—	1=3,1%	4=4,10%	2
	Geringer Nystagmus	—	—	1=16,7%	1=20%	—	—	2=3,0%	1
	Nystagmus	11=30,6%	2=33,3%	4=66,6%	3=100%	4=80%	8=80%	22=68,8%	27
	Starker Nystagmus	—	—	—	—	—	—	2=6,2%	1
	Unsicherer Nystagmus	1=2,8%	—	—	—	2=20%	3=9,4%	6=6,1%	3

Tabelle VIII.

Augenbewegungen nach Drehen von links nach rechts
unter den untersuchten Taubstummen bei verschiedener Blick-
richtung in absoluten Zahlen.

Summa der Gehörorgane		Absolute Taubheit	Gruppe I	Gruppe II	Gruppe III	Gruppe IV	Gruppe V	Gruppe VI	Gesamt- zahl der	
		36	6	6	3	5	10	32	Gehör- organe	Indi- viduen
Nystagmus nach Drehen von links nach rechts beim Blick nach links	Kein Nystagmus	23	4	1				4	32	16
	Einzelne Zuckungen	1	0	0				1	2	1
	Geringer Nystagmus	0	0	1		1		0	2	1
	Nystagmus	11	2	4	3	4	8	22	56	28
	Starker Nystagmus							2	2	1
	Unsicherer Nystagm.	1					2	3	6	3
beim Blick geradeaus	Kein Nystagmus	28	5	4	1	2	4	12	56	28
	Einzelne Zuckungen									
	Geringer Nystagmus	6		1	1	2		10	20	10
	Nystagmus	1	1	1	1	1	4	7	16	8
	Unsicherer Nystagm.	1					2	3	6	3
	Starker Nystagmus									
beim Blick nach rechts	Kein Nystagmus	35	6	4	2	4	6	21	78	39
	Einzelne Zuckungen			1			1	2	4	2
	Geringer Nystagmus							2	2	1
	Nystagmus			1	1	1	1	4	8	4
	Starker Nystagmus									
	Unsicherer Nystagm.	1					2	3	6	3

Die genannten Autoren suchten in ihrer Abhandlung die großen Differenzen der letzten Querreihe der Tabelle zu erklären; ich werde auf diese Frage später zurückkommen.

Die Untersuchung der Zöglinge der Nürnberger Taubstummenanstalt wurde von mir in der Anstalt selbst vorgenommen und zwar in folgender Weise.

Bevor ich zur Untersuchung mittelst der aktiven und passiven Drehung auf einem sogenannten Schwebereck schritt, wurde jeder Zögling auf spontanen Nystagmus geprüft; alsdann mußte sich der Taubstumme 10 mal aktiv um seine eigene

Achse drehen. Der Nachnystagmus wurde alsdann nach den Vorschriften Wanners unter Fixierung eines in 20—30 cm Entfernung vorgehaltenen Fingers bei Blick nach rechts, geradeaus und links geprüft.

Die Untersuchung nahm ziemlich viel Zeit in Anspruch; denn bei jedem Zögling mußte 8 mal der Drehversuch gemacht werden.

Aktives Drehen von links nach rechts:

1. Prüfung des Nachnystagmus beim Blick nach rechts, geradeaus, links,

Tabelle IX.

Augenbewegungen nach Drehversuch von rechts nach links unter den untersuchten Taubstummen bei verschiedener Blickrichtung in absoluten Zahlen.

Summa der Gehörorgane		Absolute Taubheit	Gruppe I	Gruppe II	Gruppe III	Gruppe IV	Gruppe V	Gruppe VI	Gesamt- zahl der	
									Gehör- organe	Indi- viduen
		36	6	6	3	5	10	32	98	49
Nystagmus nach Drehen von rechts nach links beim Blick nach rechts	Kein Nystagmus	21	4	1				4	30	15
	Einzelne Zuckungen	3						1	4	2
	Geringer Nystagmus			1	1	2			4	2
	Nystagmus	11	2	4	1	2	8	34	54	27
	Starker Nystagmus				1	1			2	1
	Unsicherer Nystagm.	1					2	3	6	3
beim Blick geradeaus	Kein Nystagmus	27	5	2	1	2	2	7	46	23
	Einzelne Zuckungen	1		1					2	1
	Geringer Nystagmus	7	1	3	1	2	6	20	40	20
	Nystagmus				1	1		2	4	2
	Starker Nystagmus									
	Unsicherer Nystagm.	1					2	3	6	3
beim Blick nach links	Kein Nystagmus	35	6	5	2	4	7	23	82	41
	Einzelne Zuckungen			1			1	2	4	2
	Geringer Nystagmus							2	2	1
	Nystagmus				1	1		2	4	2
	Starker Nystagmus									
	Unsicherer Nystagm.	1					2	3	6	3

Tabelle X.

Augenzugbewegungen nach Drehversuch von links nach rechts
unter den untersuchten 49 Taubstummen bei verschiedener
Blickrichtung in Prozentzahlen.

Summa der Gehörorgane		Absolute Taubheit	Gruppe I	Gruppe II	Gruppe III	Gruppe IV	Gruppe V	Gruppe VI	Gesamt- zahl der	
									Gehör- organe	Indi- viduen
		36	6	6	3	5	10	32	98	49
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nystagmus nach Drehen von links nach rechts beim Blick nach links	Kein Nystagmus	63,9	66,7	16,7				12,5	32,6	
	Einzelne Zuckungen	2,8		16,6				3,1	2	
	Geringer Nystagmus					20			2	
	Nystagmus	30,5	33,3	66,7	100	80	80	68,7	57,2	
	Starker Nystagmus							6,3	2	
	Unsicherer Nystagm.	2,8					20	9,4	6,2	
beim Blick geradeaus	Kein Nystagmus	77,9	83,3	66,6	33,4	40	40	37,5	57,1	
	Einzelne Zuckungen									
	Geringer Nystagmus	16,7		16,7	33,3	40		31,3	20,4	
	Nystagmus	2,7	16,7	16,7	33,3	20	40	21,8	16,3	
	Starker Nystagmus									
	Unsicherer Nystagm.	2,7					20	9,4	6,2	
beim Blick nach rechts	Kein Nystagmus	97,3	100	66,7	66,7	80	60	65,6	79,6	
	Einzelne Zuckungen			16,6			10	6,2	4	
	Geringer Nystagmus							6,2	2,0	
	Nystagmus			16,6	33,3	20	10	12,6	8,3	
	Starker Nystagmus									
	Unsicherer Nystagm.	2,7					20	9,4	6,1	

3—5 Minuten Pause für den betreffenden Taubstummen,
während welcher Zeit ein anderer Zögling untersucht wurde.

Aktives Drehen von links nach rechts:

2. Prüfung des Nystagmus beim Blick nach links, gerade-
aus rechts.

Aktives Drehen von rechts nach links. —

Der Nystagmus wurde in derselben Weise geprüft.

Ebenso wurde verfahren bei der Prüfung des Nystagmus
nach der passiven Drehung. In der Tabelle IV sind die

Tabelle XI.

Augenbewegungen nach Drehversuch von rechts nach links
unter den 49 untersuchten Taubstummen bei verschiedener
Blickrichtung in Prozentzahlen.

Summa der Gehörorgane		Absolute Taubheit	Gruppe I	Gruppe II	Gruppe III	Gruppe IV	Gruppe V	Gruppe VI	Gesamt- zahl der	
									Gehör- organe	Indi- viduen
		36	6	6	3	5	10	32	98	49
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Nystagmus nach Drehen von rechts nach links beim Blick nach rechts	Kein Nystagmus	58,4	66,7	16,6				12,5	30,6	
	Einzelne Zuckungen	8,3						3,1	4,0	
	Geringer Nystagmus			16,6	33,4	40			4,1	
	Nystagmus	30,5	33,3	66,7	33,3	40	80	75	55,1	
	Starker Nystagmus				33,3	20			2,0	
	Unsicherer Nystagm.	2,8					20	9,4	6,2	
beim Blick geradeaus	Kein Nystagmus	75	83,3	33,4	33,4	40	20	21,5	46,9	
	Einzelne Zuckungen	2,8		16,6					2	
	Geringer Nystagmus	19,4	16,7	50	33,3	40	60	62,6	40,8	
	Nystagmus				33,3	20		6,2	4,1	
	Starker Nystagmus									
	Unsicherer Nystagm.	2,8					20	9,4	6,2	
beim Blick nach links	Kein Nystagmus	97,2	100	83,4	66,7	80	70	71,9	83,7	
	Einzelne Zuckungen			16,6			10	6,2	4,1	
	Geringer Nystagmus							6,2	2	
	Nystagmus				33,3	20		6,3	4	
	Starker Nystagmus									
	Unsicherer Nystagm.	2,8					20	9,4	6,2	

Resultate, die ich auf diese Weise gewann, zusammenge-
stellt.

Schwanken wurde notiert nach der aktiven Drehung ohne
Rücksicht auf die Drehungsrichtung.

Es zeigten kein Schwanken	17 = 34,7 Proz.
Geringes Schwanken	5 = 10,2 „
Schwanken	21 = 42,8 „
Starkes Schwanken	5 = 10,2 „
Unsicher war es bei	1 = 2,1 „

Ohne Rücksicht auf die Drehungsrichtung zeigten

Keinen Nystagmus	15 = 30,6 Proz.
Einzelne Zuckungen	2 = 4,1 „
Geringen Nystagmus	1 = 2,0 „
Nystagmus	27 = 55,2 „
Starken Nystagmus	1 = 2,0 „
Unsicheren Nystagmus	3 = 6,1 „

Bei Vergleichung dieser Zahlen mit den von Bezold und den anderen Autoren gefundenen Zahlen ist die verschiedene Einteilung natürlich störend. Ich glaube aber, daß nur das Ausbleiben des Nystagmus von besonderer Wichtigkeit ist. Vergleichen wir nur die hierfür gefundenen Zahlen, so finden wir für das

Fehlen des Schwankens

bei Bezold 93, Bezold 98, Denker Wanner Brock
38 Proz. 47,5 Proz. 39,6 Proz. 47,2 Proz. 34,7 Proz.

Keine Augenbewegungen resp. keinen Nystagmus und nur einzelne Augenbewegungen zeigten

bei Bezold 93, Bezold 98, Denker Haßlauer
13,9 (16,9) Proz. 28,8 Proz. 41,7 Proz. 49,4 Proz.

Wanner Frey und Hammerschlag Brock
34,7 Proz. 45,2 Proz. 30,6 Proz. (34,7)¹⁾

Es ergaben sich somit Differenzen, auf deren Erklärung ich später noch zurückkommen werde. 

Ferner wollen wir noch die beiden Gruppen der Totaltauben und die Gruppe VI der Besthörenden hinsichtlich des Schwankens und des Nystagmus einander gegenüberstellen.

Wanners Resultate sind folgende:

Absolute Taubheit		Gruppe VI.
Kein Schwanken	85,7 Proz.	13,8 Proz.
Geringes Schwanken	7,9 „	36,9 „
Starkes „	6,4 „	49,3 „
Brock:		
Kein „	63,9 „	15,6 „
Geringes „	16,7 „	6,2 „
Schwanken	16,7 „	50 „
Starkes Schwanken	0 „	28,2 „
Unsicheres Schwanken	2,7 „	0 „

1) Einzelne Augenbewegungen hinzugezählt.

Wanner:	Absolute Taubheit	Gruppe IV.
Kein Nystagmus	63,5 „	7,7 „
Geringer Nystagmus	12,7 „	13,9 „
Starker „	23,8 „	78,4 „
Brock:		
Kein Nystagmus	58,3 „	12,5 „
Einzelne Zuckungen	8,3 „	3,1 „
Geringer Nystagmus	0 „	0 „
Nystagmus	30,6 „	68,8 „
Starker Nystagmus	0 „	6,2 „
Unsicheren Nystagmus	2,8 „	9,4 „

Die Ergebnisse der anderen Autoren, wenn wir nur das Fehlen des Schwankens der Augenbewegungen resp. des Nystagmus berücksichtigen, sind folgende:

Bezold 93:	Total Taube	Gruppe VI.
Kein Schwanken	54,2 Proz.	12,1 Proz.
	Total Taube	Gruppe VI.

Keine und nur einzelne Augenbewegungen	58,3 (68,4) Proz.	21,3 (25,9)
--	-------------------	-------------

Bezold 98:		
Kein Schwanken	85,3 Proz.	21,6 Proz.
Kein Nystagmus	55,9 „	2,7 „

Hinsichtlich der Verteilung des Schwankens auf die Total Tauben und Gruppe VI kam Denker zu folgenden Resultaten:

Total Taube: Kein Schwanken	42,9 Proz., Gruppe VI:
	20,0 Proz.

Denker fährt fort:

Von der 25 Zöglingen ohne Bewegungen des Augapfels waren 15 total taub und 10 hatten geringe Hörreste; von den 11 Zöglingen mit einzelnen Bewegungen des Bulbus waren 2 totaltaub, 8 hatten geringe Hörreste und nur einer gehörte der Gruppe der besser hörenden Taubstummen an. Subnormale Augenbewegungen zeigten 5 total taube, 2 über kleine Hörbezirke verfügende und 3 mit einem oder beiden Ohren zur Gruppe VI gehörige Taubstumme. Normale Bulbusbewegungen wiesen 2 total Taube, 1 mit einem kleinen Hörrest versehener und 11 mit einem oder beiden Ohren der Gruppe VI zuzurechnender Zöglinge auf. Es zeigte sich demnach, daß die Zöglinge, bei denen keine oscillatorischen Bewegungen am Bulbus auftraten, zum großen Teil total taub waren oder über nur ganz kleine Hörbezirke verfügten. Bei keinem

der gut hörenden Zöglinge fehlten die Bulbusbewegungen, dagegen traten sie bei 11 derselben (84,3 Proz.) in durchaus normaler Weise wie beim Vollsinnigen auf.

Die Resultate Denkers ziffermäßig dargestellt, ergeben folgende Zahlen für die total Tauben und die Gruppe VI.

Total Taube:		Gruppe VI
Keine Augenbewegungen in	63,7 Proz.	0 %
Vereinzelte „ „	10,4 „	0 %
Zusammen	74,1 Proz.	0 %

Indem wir abermals, wie bei Denker, die absoluten Zahlen der Originaltabellen Haßlauers in Prozente umrechnen, finden wir:

Unter 89 Gehörorganen der V. Gruppe Schwendt-Wagners¹⁾ fand er keinen Nystagmus bei 56 = 62,9 Proz. Dagegen fand er unter 31 Gehörorganen der I. Gruppe (Gehör für Worte und kurze Sätze) keinen Nystagmus bei 7 = 22,6 Proz.

Hugo Frey und Hammerschlag teilten die Taubstummhinsichtlich ihrer Hörreste in 3 Gruppen ein:

1. Taubstumme mit bedeutenden Hörresten (Wort und Satzgehör ein- oder beiderseitig) Begabte; entspricht der Gruppe I nach Schwendt und Wagner.
2. Mit geringen Hörresten (Vokal- und Schallgehör) Begabte.
3. Total Taube.

Hinsichtlich der Verteilung des Nystagmus auf Gruppe I und Gruppe III kamen sie zu folgendem Resultate:

Von 18 Kindern mit bedeutenden Hörresten zeigten keinen Nystagmus 3 = 16,6 Proz.

Von 52 total Tauben dagegen zeigten keinen Nystagmus 32 = 61,5 Proz.

Es schließen sich demnach diese Resultate den von anderen Autoren gefundenen gleichsinnig an.

Es zeigt sich also, daß die Gruppe der total Tauben und die Gruppe VI der Besthörenden, die was Häufigkeit und Doppelseitigkeit betrifft, einander am nächsten stehen, in Beziehung auf das Vorhandensein von Schwanken und Nystagmus nach dem Drehen sich geradezu entgegengesetzt verhalten.

Bei der Zusammenstellung der Tabellen der von mir untersuchten Taubstummen habe ich nur die Aufzeichnungen nach der passiven Drehung benutzt, Die Unterschiede in dem Be-

1) Ohne nachweisbare Hörreste.

fund nach der aktiven und nach der passiven Drehung sind so gering, daß man sie unberücksichtigt lassen konnte.

Nach Abschluß dieser meiner Untersuchungen über den Drehschwindel der Taubstummen erschien die Arbeit Baranys in der er das Auftreten oder Fehlen von Nystagmus nach Einspritzung von verschieden temperierter Flüssigkeit ins Ohr als einen Beweis des funktionierenden oder des nicht funktionstüchtigen zerstörten Bogengangapparates ansieht.

Ich habe mich nach Durchsicht der Baranyschen Arbeit sofort daran gemacht, die Taubstummen der Nürnberger Anstalt mit dieser Methode zu untersuchen. Zu gleicher Zeit stellte ich meine diesbezüglichen Versuche an den Normalhörenden an.

Wegen Zeitmangels, die großen Ferien der Kinder waren nicht mehr fern, mußte ich mich darauf beschränken, Ausspritzungen bei aufrechter Körperhaltung mit kaltem Wasser, d. h. mit Wasser unter Körpertemperatur vorzunehmen. Der Gang der Untersuchung war derselbe wie der bei den Vollsinnigen.

9 von den zur Untersuchung gelangten Taubstummen zeigten bei starker Bulbusdrehung nach rechts oder links spontanen Nystagmus. Bei einigen dieser Kinder war eine deutliche Beeinflussung durch den kalorischen Nystagmus sichtbar, bei anderen dagegen war eine Einwirkung nicht ganz klar; diese Fälle wurden als unsicher bezeichnet.

In Tabelle XII (S. 278 f.) finden sich alle diesbezüglichen Notizen: Keinen kalorischen Nystagmus, weder nach Einspritzung in das rechte noch in das linke Ohr zeigten 17 Individuen = 34,7 Proz. Nach Drehen zeigten keinen Nystagmus 15 Kinder = 30,6 Proz.

Es sei mir zur Vergleichung gestattet, diejenigen der Kinder, welche keinen Nystagmus zeigten, hier anzuführen.

Keinen Nystagmus nach Drehen ohne Rücksicht auf die Drehungsrichtung zeigten die Kinder mit der laufenden Nr. 2. 8. 9. 15. 17. 22. 24. 25. 28. 42. 47. 48. 49. 18. 19.

Keinen kalorischen Nystagmus zeigten:

2. 4. 8. 13. 15. 17. 19. 21. 24. 25. 28. 29. 34. 41. 47. 49. 42.

Keinen kalorischen Nystagmus zeigten also, während nach dem Drehversuch Nystagmus notiert ist: Nr. 4. 13. 21. 29. 34. 41.

Nr. 4. Beiderseitige totale Taubheit, spontaner Nystagmus

Befund nach Drehversuch.

Nach Drehen von links nach rechts
beim Blick nach

| | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| rechts | links | geradeaus |
| kein Nystagmus, | kein Nystagmus, | Nystagmus. |

Nach Drehen von rechts nach links
beim Blick nach

| | | |
|-----------|----------------|-----------------|
| rechts | geradeaus | links |
| Nystagmus | kein Nystagmus | kein Nystagmus. |

Berücksichtigen wir den spontanen Nystagmus, so ist der Nachnystagmus nach Drehen wohl fälschlich notiert.

Nr. 13 rechts VI zeigt nach Drehversuch deutlichen Nystagmus links VI mus neben starkem Schwanken.

Befund nach Drehversuch:

Nach Drehen von links nach rechts
beim Blick nach

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| rechts | geradeaus | links, |
| einzelne Zuckungen, | geringer Nystagmus, | Nystagmus. |

Nach Drehen von rechts nach links
beim Blick nach

| | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| rechts | geradeaus | links |
| Nystagmus, | geringer Nystagmus, | geringer Nystagmus. |

Auch bei wiederholter Ausspritzung der beiden Ohren (ich ging mit der Temperatur bis auf 12° C herunter) war kein Nystagmus auszulösen.

Eine Erklärung vermag ich hierfür nicht zu geben.

Nr. 21. Beiderseitige totale Taubheit. Nur nach Drehen von rechts nach links zeigten sich beim Blick nach rechts einzelne Zuckungen, die wohl nicht als wirklicher Nystagmus anzusprechen waren.

Nr. 29. rechts V zeigt spontanen Nystagmus bei extremer links I

Bulbusdrehung nach rechts und links.

Notizen nach Drehversuch.

Nach Drehen von links nach rechts
beim Blick nach

| | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| rechts | geradeaus | links |
| kein Nystagmus, | kein Nystagmus, | Nystagmus. |

Nach Drehen von rechts nach links beim Blick nach

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| rechts | geradeaus | links |
| Nystagmus, | kein Nystagmus, | kein Nystagmus. |

Tabelle XII.¹⁾

| Laufende Nr. | Name | Alter in Jahren | Gruppe nach Bezoed | | Nystagnus nach Einspritzung von Wasser (unter Körpertemperatur.) in den Gehörgang rechts: | | | | in den Gehörgang links: | | | | Bemerkungen |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|---|----------------|----------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------------|--|
| | | | rechts | links | rechts | gerade-
aus | links | Schwin-
del | rechts | gerade-
aus | links | Schwin-
del | |
| 1 | Conrad Ungerer | 8 | VI | VI | 0 | 0 | eul Zgn | — | eul Zgn | 0 | 0 | — | Spontaner Nystagnus bei extremer Blickrichtung nach rechts oder links |
| 2 | Elise Waldrab | 8 | tot. Tbh. | tot. Tbh. | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | Rubrikat fixiert schlecht |
| 3 | Georg Zech | 8 | I | VI | 0 | 0 | N. | — | N. | 0 | 0 | — | Spontaner Nystagnus bei extremer Bulbusdrehung |
| 4 | Georg Salfner | 9 | tot. Tbh. | tot. Tbh. | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | Wolfgang Oettlein | 10 | VI | VI | eul Zgn | ger. N. | N. | — | N. | ger. N. | 0 | — | |
| 6 | Babette Müller | 9 | tot. Tbh. | tot. Tbh. | 0 | = | = | — | = | = | 0 | — | |
| 7 | Eva Lang | 13 | VI | VI | 0 | = | = | — | = | eul Zgn | 0 | — | Spontaner Nystagnus bei extremer Blickrichtung nach rechts. Fixiert schlecht |
| 8 | Marg. Held | 9 | tot. Tbh. | tot. Tbh. | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | Spontaner Nystagnus bei extremer Blickrichtung nach rechts und links |
| 9 | Marie Fischer | 10 | = | = | 0 | 0 | 0 | — | unsielh. | unsielh. | unsielh. | — | |
| 10 | Michael Disterer | 8 | V | V | 0 | ger. N. | N. | — | N. | ger. N. | 0 | — | |
| 11 | Carl Brunner | 8 | — | — | 0 | = | = | — | = | eul Zgn | 0 | — | |
| 12 | Karl Bast | 9 | Taubh. | VI | unsielh. | unsielh. | unsielh. | — | unsielh. | unsielh. | unsielh. | — | Spontaner Nystagnus bei extremer Blickrichtung nach rechts und links |
| 13 | Marie Danbinger | 12 | VI | VI | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | Hans Eckstein | 12 | tot. Tbh. | tot. Tbh. | 0 | ger. N. | N. | — | N. | ger. N. | 0 | — | |

[Fortsetzung von Tabelle XII.]

| Laufende Nr. | Name | Alter in Jahren | Gruppe nach Bezold | | Nystagmus nach Einspritzung von Wasser (28° C) in den Gehörgang rechts: | | | | Gehörgang links: | | | | Bemerkungen |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|---|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------|---|--|
| | | | rechts | links | rechts | Gerade- aus | links | Schwin- del | rechts | Gerade- aus | links | Schwin- del | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Georg Himmelscher | 13 | Taubh. | IV | 0 | ger. N. | N. | — | N. | eul Zgn | 0 | — | Spontaner Nystagmus beim Blick nach rechts |
| 40 | Georg Lieb | 11 | VI | IV | 0 | = | N. | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 41 | Johann Linz | 12 | V | VI | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 42 | Georg Merkl | 11 | II | VI | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 43 | Andreas Ulrich | 14 | VI | VI | 0 | ger. N. | N. | — | st. N. | N. | ger. N. | starker Schwin- del, Brechreiz kalter Schweiß | |
| 44 | Karl Zeh | 14 | VI | V | unsich. | unsich. | unsich. | — | unsich. | unsich. | unsich. | Ausschläge sehr klein | |
| 45 | Konrad Brunner | 14 | V | V | 0 | 0 | 0 | — | N. | ger. N. | 0 | | — |
| 46 | Marie Schmidtlein | 14 | Taubh. | V | 0 | eul Zgn | N. | — | N. | = | 0 | | — |
| 47 | Theodor Gruber | 18 | tot. Tbh. | tot. Tbh. | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | | — |
| 48 | Johann Forster | 13 | I | VI | 0 | 0 | 0 | — | N. | ger. N. | 0 | | — |
| 49 | Wilhelm Haßler | 13 | Taubh | I | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 50 | WilhelmineWunderle | 12 | VI | VI | ger. N. | N. | st. N. (rot.) | — | N. | ger. N. | 0 | — | |

Eine Verwechselung des spontanen Nystagmus mit dem Kalornystagmus ist wohl wahrscheinlich.

Nr. 34 r. VI zeigt nach dem Drehversuch nur einzelne Zuckungen,

l. Taubheit die wohl nicht als wirklicher Nystagmus anzusprechen sind.

Nr. 41 rechts V. links VI.

Bei diesem Zögling habe ich nach dem Drehversuch einmal „unsicher“ und einmal kein Nystagmus notiert. Durch das Fehlen des Nystagmus nach den Einspritzungen ist wohl das Fehlen des Nystagmus auch nach dem Drehversuch anzunehmen.

Umgekehrt zeigten keinen Nystagmus nach Drehversuch, während nach den Ausspritzungen unsicherer oder sicherer Nystagmus vorhanden war die Nr. 9. 18. 22. 28.

Nr. 9 beiderseitige totale Taubheit zeigt spontanen Nystagmus.

Ausspritzung des rechten Ohres ergibt keinen Nystagmus.

Bei Ausspritzung des linken Ohres war, der Befund unsicher.

Nr. 18 rechts Taubheit, rechts kalorischer Nystagmus negativ,
links VI, links „ „ unsicher.

Nr. 22 rechts I Spontaner Nyst. bei extremer Bulbusdrehung,
links VI rechts kalorischer Nystagmus negativ; links
geringer Nystagmus bei Blick nach rechts.

Nr. 48 rechts I, rechts kalorischer Nystagmus negativ,
links VI, links Nystagmus bei Blick nach rechts. Geringer
Nystagmus bei Blick geradeaus, kein Nystagmus bei Blick nach
links (Ausschläge sehr klein).

Betrachten wir in dieser Weise die Differenzen, die sich bezüglich des Auftretens des Nystagmus bei den zwei Methoden der Prüfung derselben ergeben haben, so schmelzen diese auf ein Minimum zusammen. Bei einem großen Teil der Fälle machte die Anwesenheit von spontanem Nystagmus die Beurteilung schwierig, bei einem anderen Teil war der Nystagmus als unsicher notiert worden oder die Ausschläge waren sehr klein, sodaß sie leicht übersehen werden konnten.

Nur für den Fall 13 treffen diese Regeln nicht zu; eine Erklärung für das Versagen des kalorischen Nystagmus vermag ich nicht zu geben. Ob durch das Ausspritzen der Ohren bei den Taubstummen Schwindel ausgelöst wurde, konnte nicht festgestellt werden; den meisten Taubstummen fehlte der Begriff Schwindel vollständig.

Nur bei einem, Andreas U., Nr. 43 trat nach Ausspritzung Brechreiz und kalter Schweiß auf.

40 von 98 auf den kalorischen Nystagmus untersuchte Gehörorgane, die 23 Individuen angehörten, zeigten keinen Nystagmus. Von diesen 40 gehörten 34 17 Individuen an, d. h. 17 Individuen mit 34 Gehörorganen zeigten weder rechts noch links kalorischen Nystagmus. Bei den noch übrig bleibenden 6 Individuen fehlte nur auf einer Seite der kalorische Nystagmus, während das andere Ohr diesen auslösen ließ. Was die Verteilung dieser 40 Gehörorgane hinsichtlich ihrer Hörreste betrifft, so sind 25 davon totaltaub, 5 gehören der Gruppe I, 1 der Gruppe II, 1 der Gruppe IV, 3 der Gruppe V und 5 der Gruppe VI an.

Wenn wir die Totaltauben und die Gruppe VI der Besthörenden hinsichtlich des Nystagmus vergleichen, so tritt auch hier das entgegengesetzte Verhalten in dieser Beziehung klar zu Tag.

| Es zeigten: | die total Tauben | die Gruppe VI |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Bei Ausspritzung
des rechten Ohres | | |
| keinen Nystagmus | 14 = 66,7 Proz. | 2 = 14,3 Proz. |
| einzelne Zuckungen | 0 = 0 „ | 1 = 7,1 „ |
| Geringen Nystagmus | 0 = 0 „ | 0 = 0 „ |
| Nystagmus | 5 = 13,8 „ | 8 = 57,2 „ |
| Starken Nystagmus | 0 = 0 „ | 1 = 7,1 „ |
| Unsicheren Nystagmus | 2 = 9,5 „ | 2 = 14,3 „ |

Nach Einspritzen des linken Ohres zeigten

| | total Taube | Gruppe VI |
|----------------------|-----------------|----------------|
| Keinen Nystagmus | 11 = 73,3 Proz. | 3 = 16,6 Proz. |
| Einzelne Zuckungen | 0 = 0 „ | 1 = 5,6 „ |
| Geringen Nystagmus | 0 = 0 „ | 3 = 16,7 „ |
| Nystagmus | 3 = 20 „ | 7 = 38,9 „ |
| Starken Nystagmus | 0 = 0 „ | 1 = 5,5 „ |
| Unsicheren Nystagmus | 1 = 6,7 „ | 3 = 16,7 „ |

Das Verhältnis der anderen Gruppen nach Bez old zum Nystagmus ist aus der beigefügten Tabelle XIII und XIV ersichtlich. Gruppe I neigt zu den total Tauben, für die Gruppen II, III, IV, V kann nichts Sicheres gesagt werden, doch neigten sie eher zur Gruppe VI als zu den total Tauben hin.

Tabelle XIII.

Untersuchungen des Nystagmus nach Ausspritzung des rechten
 Ohres mit Wasser von 28° C bei den 49 Taubstummten in
 absoluten Zahlen und in Prozentzahlen bei verschiedener
 Blickrichtung.

| Summa der Gehörorgane | | Absolute
Taubheit | Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III | Gruppe IV | Gruppe V | Gruppe VI | * Zahl der
Gehörorgane |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------------------|
| | | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 49 |
| Nystagmus
bei Blick
rechts | Kein Nystagmus | 14 =
66,7% | 2 =
66,7% | 1 =
33,3% | | | 3 =
60% | 2 =
14,3% | 22 =
44,9% |
| | Einzelne Zuckungen | | | | | | | 1 =
7,1% | 1 =
2,0% |
| | Geringer Nystagmus | | | | | | | | |
| | Nystagmus | 5 =
23,8% | 1 =
33,3% | 2 =
66,7% | 1 =
100% | 1 =
50% | 2 =
40% | 8 =
57,2% | 20 =
40,8% |
| | Starker Nystagmus | | | | | | | 1 =
7,1% | 1 =
2,0% |
| | Unsicherer Nystagmus | 2 =
9,5% | | | | 1 =
50% | | 2 =
14,3% | 5 =
10,3% |
| Blick
deaus | Kein Nystagmus | 14 =
66,7% | 3 =
100% | 1 =
33,3% | | 1 =
50% | 3 =
60% | 3 =
21,4% | 24 =
48,9% |
| | Einzelne Zuckungen | 1 =
4,8% | | 2 =
66,7% | | | | | 3 =
6,1% |
| | Geringer Nystagmus | 4 =
19% | | | 1 =
100% | | 2 =
40% | 8 =
57,2% | 10 =
32,7% |
| | Nystagmus | | | | | | | 1 =
7,1% | 1 =
2,0% |
| | Starker Nystagmus | | | | | | | | |
| | Unsicherer Nystagmus | 2 =
9,5% | | | | 1 =
50% | | 2 =
14,3% | 5 =
10,3% |
| Blick
nach
links | Kein Nystagmus | 19 =
90,5% | 3 =
300% | 3 =
100% | 1 =
100% | 1 =
50% | 5 =
100% | 9 =
64,3% | 41 =
83,6% |
| | Einzelne Zuckungen | | | | | | | 2 =
14,3% | 2 =
4,1% |
| | Geringer Nystagmus | | | | | | | 1 =
7,1% | 1 =
2,0% |
| | Nystagmus | | | | | | | | |
| | Starker Nystagmus | | | | | | | | |
| | Unsicherer Nystagmus | 2 =
9,5% | | | | 1 =
50% | | 2 =
14,3% | 5 =
10,3% |

Von den 13 als beiderseitig total taub gefundenen Indi-
 viduen mit 26 Gehörorganen zeigten nach dem Drehversuch nur

Tabelle XIV.

Untersuchungen des Nystagmus nach Ausspritzung des linken Ohres mit Wasser von 28° C bei den 49 Taubstummten in absoluten und Prozentzahlen bei verschiedener Blickrichtung.

| Summa der Gehörorgane | | Absolute Taubheit | Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III | Gruppe IV | Gruppe V | Gruppe VI |
|--|----------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| | | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| Kalorischer Nystagmus links beim Blick nach rechts | Kein Nystagmus | 11 =
73,3% | 3 =
100% | | | 1 =
33,3% | | 3 =
16,6% |
| | Einzelne Zuckungen | | | | | | | 1 =
5,6% |
| | Geringer Nystagmus | | | 2 =
66,7% | | 1 =
33,3% | 1 =
20% | 3 =
16,7% |
| | Nystagmus | 3 =
20,0% | | | 2 =
100% | 1 =
33,4% | 3 =
60% | 7 =
38,9% |
| | Starker Nystagmus | | | | | | | 1 =
5,5% |
| | Unsicherer Nystagmus | 1 =
6,7% | | 1 =
33,3% | | | 1 =
20% | 3 =
16,7% |
| beim Blick geradeaus | Kein Nystagmus | 11 =
73,3% | 3 =
100% | | | 1 =
33,3% | 1 =
20% | 5 =
27,7% |
| | Einzelne Zuckungen | 1 =
6,7% | | 2 =
66,7% | | 1 =
33,3% | 3 =
60% | 3 =
16,7% |
| | Geringer Nystagmus | 2 =
13,3% | | | 2 =
100% | 1 =
33,4% | | 6 =
33,3% |
| | Nystagmus | | | | | | | 1 =
5,6% |
| | Starker Nystagmus | | | | | | | |
| | Unsicherer Nystagmus | 1 =
6,7% | | 1 =
33,3% | | | 1 =
20% | 3 =
16,7% |
| beim Blick nach links | Kein Nystagmus | 14 =
93,3% | 3 =
100% | 2 =
66,7% | 2 =
100% | 3 =
100% | 4 =
80% | 14 =
77,7% |
| | Einzelne Zuckungen | | | | | | | |
| | Geringer Nystagmus | | | | | | | 1 =
5,6% |
| | Nystagmus | | | | | | | |
| | Starker Nystagmus | | | | | | | |
| | Unsicherer Nystagmus | 1 =
6,7% | | 1 =
33,3% | | | 1 =
20% | 3 =
16,7% |

(3 mit 6 Gehörorganen Nystagmus; bei dem Zögling M. Bl. Nr. 21) wurden nach dem Drehversuch nur einzelne Zuckungen konstatiert, die ich aber nicht als wirklichen Nystagmus be-

zeichnen konnte. Bei der Prüfung des kalorischen Nystagmus lagen nur 2 Kinder deutlichen Nystagmus auf und zwar die Kinder mit den laufenden Nummern 6 und 14, die auch nach Drehversuch Nystagmus zeigten. Nr. 4 dagegen zeigte nach Ausspritzung der Ohren keinen Nystagmus. Da aber bei diesem Kinde spontaner Nystagmus vorhanden war, war eine Täuschung leicht möglich. Es stimmen also die bei den Untersuchungsmethoden gefundenen Resultate überein.

Einer besonderen Besprechung bedürfen noch die einseitig Tauben, die in folgender Tabelle XV zusammengestellt sind.

Diese 10 Gehörorgane sind demnach vergesellschaftet, 2 mal mit Gruppe I, 2 mal mit Gruppe II, 1 mal mit Gruppe III, 1 mal mit Gruppe IV, 1 mal mit Gruppe V, 3 mal mit Gruppe VI.

Betrachten wir zuerst den kalorischen Nystagmus.

Von den 8 rechtsseitigen tauben Gehörorganen zeigten:

Nystagmus 3.

Keinen Nystagmus 3.

Unsicheren Nystagmus 2.

Von den 2 linksseitigen tauben Gehörorganen zeigte 1 deutlichen Nystagmus und das andere keinen Nystagmus.

Von den 4 tauben Gehörorganen, die keinen Nystagmus zeigten, zeigten die entsprechenden mit Hörresten versehenen anderen Ohren 3 mal keinen Nystagmus, einmal war unsicherer Nystagmus notiert.

„Die einseitig tauben Gehörorgane als einseitig labyrinthlose betrachtet, kann man sich theoretisch falls das andere Labyrinth funktionstüchtig ist, das Verhalten des Nystagmus leicht konstruieren. Findet die Drehung nach der gesunden Seite statt, so wird während der Drehung das gesunde Labyrinth stärker erregt als beim Anhalten, da die während der Drehung auftretende Endolymphbewegung als stärkerer physiologischer Reiz wirkt, wie die entgegengesetzte beim Anhalten. Es wird also während der Drehung nach der gesunden Seite der Nystagmus stärker sein als der beim Anhalten auftretende. Umgekehrt wird der beim Anhalten nach Drehung nach der kranken Seite auftretende Nystagmus stärker sein, als der während dieser Drehung bestehende. Untersucht man nur den Nachnystagmus beim Anhalten, so wird man also beim Anhalten nach Drehung zur kranken Seite stärkeren Nystagmus finden, als beim Anhalten nach Drehung zur gesunden Seite.“

| Laufende Nr. | Gruppe | | Art der Erkrankung | Nystagmus nach Drehen von | | | | Bemerkungen | Kalorischer Nystagm. | | | | Bemerkungen | | |
|--------------|--------|-------|--------------------|---|------|--|----------------|-------------|------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|------|--|
| | rechts | links | | links nach rechts:
Blick nach rechts | | rechts nach links:
Blick nach links | | | rechts:
Blick nach rechts | | links:
Blick nach links | | | | |
| | | | | Gerade-
aus | link | rechts
aus | Gerade-
aus | | rechts
aus | Gerade-
aus | link | rechts
aus | Gerade-
aus | link | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|---|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 12 | Taabh. | VI | angeboren | wegen spont. Nystagmus unsicher | | | | maß. S. | wegen spont. Nystagmus unsicher | | | | |
| 17 | = | I | = | k. N. | k. N. | k. N. | k. N. | k. S. | k. N. | k. N. | k. N. | k. N. | |
| 18 | = | VI | wohl in den erst. Jahr. d. Rachitis entstanden | = | = | = | = | = | = | = | = | unsich. | |
| 27 | = | II | mit 4 Jahren dch. Genickkrampf erw. | = | = | N. | ecl Zgn | ger. S. | unsich. | unsich. | ger. N. | ecl Zgn | k. N. |
| 31 | = | III | mit 1 1/2 Jahr. dch. Masern u. Lungenentzdg. erw. | = | = | = | ger. N. | Schw. | k. N. | ger. N | N. | ger. N. | = |
| 39 | = | IV | angeboren durch Genickkrampf im 1. Lebensjahr. erworben | = | I. N. | = | = | er. S. | = | = | = | ecl Zgn | = |
| 46 | = | V | = | = | N. | = | k. N. | Schw. | = | ecl Zgn | = | ger. N. | = |
| 49 | = | I | mit 10 Jahren d. Meningitis cerebro spinalis erw. | = | k. N. | k. N. | = | k. S. | = | k. N. | k. N | k. N. | = |
| 26 | II | Taabh. | wahrscheinlich angebort. | = | ger. N. | N. | ger. N. | Schw | = | ger. N. | N. | N. | ecl Zgn |
| 34 | VI | = | mit 3 1/2 Jahr. dch. Gehirnhautentzündung erw. | = | k. N. | ecl Zgn | k. N. | ger. S. | = | k. N. | k. N. | k. N. | = |

Aus-
schlag
sehr
gering.

Die Bedingungen, die in vorliegendem gestellt sind, um durch Drehen eine einseitige Zerstörung des Labyrinthes konstatieren zu können, sind bei meinem Material nicht gegeben; es sind deshalb auch aus den Resultaten, die die einseitig Tauben hinsichtlich des Nystagmus nach Drehen ergeben haben, keine Schlüsse zu ziehen.

Viel genauer ist sicherlich durch das Fehlen des kalorischen Nystagmus einseitige Zerstörung des Labyrinthes nachzuweisen.

Es ist uns demnach meiner Ansicht nach in der Methode der Einspritzung von verschieden temperierter Flüssigkeit in das Ohr ein Verfahren gegeben, durch das wir die einseitige Zerstörung des Bogengangapparates mit ziemlicher Sicherheit nachweisen können, ein Verfahren, das die anderen, als Drehung, Galvanisierung, an Exaktheit und Einfachheit weit übertrifft.

Hugo Frey und Viktor Hammerschlag suchten in ihrer Abhandlung über den Drehschwindel der Taubstummen die Frage zu lösen, wodurch die Differenzen der verschiedenen Autoren betreffs der Zahlen für das Fehlen des Nystagmus bedingt seien.

Ihr Resultat ist eigentlich ein negatives. Die beiden Autoren suchten die Ursache in der verschiedenen Häufigkeit der angeboren und der erworbenen Taubstummheit in dem Material der Autoren.

Die genannten Autoren schieden die Taubgeborenen von den später Ertaubten. Bei der Untersuchung dieser beiden Gruppen bezüglich des Auftretens oder des Fehlens des Nachnystagmus kamen sie zu folgenden Zahlen:

Von 45 später Ertaubten zeigten Nystagmus $12 = 26,7$ Proz. keinen Nystagmus zeigten $29 = 61,4$ Proz. und das Resultat war fraglich bei $4 = 8,9$ Proz.

Von 43 Taubgeborenen zeigten Nystagmus $31 = 72,1$ Proz., keinen Nystagmus zeigten $11 = 25,6$ Proz. und das Resultat war fraglich bei $1 = 2,3$ Proz.

Während so nach von den, als später ertaubt bezeichneten Kindern nahezu zwei Drittel sich als Versager erwiesen, finden wir unter den taubgeborenen Kindern bei mehr als zwei Drittel eine positive Reaktion.

Nach noch schärferer Trennung der später Ertaubten und der kongenitaltauben kamen die beiden Autoren zu folgenden Zahlen:

Von 26 später Ertaubten zeigten Nystagmus $4 = 15,4$ Proz., keinen Nystagmus zeigten $21 = 80,8$ Proz. und das Resultat war fraglich bei $1 = 3,8$ Proz.

Von 21 kongenital Tauben zeigten Nystagmus $15 = 71,4$ Proz., keinen Nystagmus zeigten $5 = 23,8$ Proz. und das Resultat war fraglich bei $1 = 4,8$ Proz.

Um noch weiteres Material zu gewinnen, haben die Autoren aus den Tabellen Wanners die 89 ätiologisch bestimmbaren Fälle abgesondert.

Von diesen 89 Fällen betrafen 41 angeborene, 48 erworbene Taubstummheit.

Von den 41 Taubgeborenen ergaben $30 = 73,2$ Proz. positive Reaktionen.

Von den 48 später Ertaubten ergaben nur $18 = 37,5$ Proz. positive Reaktion.

Weiter stellten sich die Autoren die Frage: „Lassen sich Beziehungen zwischen dem Grade der Hörstörungen und der Einschränkung in der Funktion der Bogengänge feststellen?“

Schon Bezold fand unter den total Tauben ein bedeutendes Überwiegen der Drehversager, unter den mit guten Hörresten ausgestatteten ein noch bedeutenderes Überwiegen der normal reagierenden.

Auf Grund ihrer weiteren Versuche kamen die Autoren zu der Ansicht, daß die von Bezold und späteren Autoren gefundene Regel, nach der die Total tauben der großen Majorität nach Drehversager sind, an den später Ertaubten sich bestätige. Bei den Taubgeborenen verhält sich ihrer Ansicht nach die Sache anders; denn sie fanden: von den 22 total Tauben der Taubgeborenen zeigten deutlichen Nystagmus $15 = 68,2$ Proz., fraglichen $0 = 0$ Proz., keinen $7 = 31,8$ Proz.

Von den 28 total Tauben der später Ertaubten zeigten deutlichen Nystagmus $3 = 10,7$ Proz., fraglichen $2 = 7,1$ Proz., keinen $23 = 82,2$ Proz.

Ich bin nun im Laufe meiner Untersuchungen zu der Ansicht gelangt, daß die Differenzen bezüglich des Fehlens des Nystagmus in den Resultaten der verschiedenen Autoren bedingt sei, durch den größeren oder kleineren Prozentsatz der doppelseitig total tauben in dem untersuchten Material, denn diese sind es, die weitaus die meisten Drehversager liefern.

Von den 13 beiderseitig total Tauben der von mir unter-

suchten Taubstummen zeigten nur 3 oder richtiger nur 2 = 15,4 Proz. Nystagmus oder in 84,6 Proz. keinen Nystagmus.

Wanner fand in 82,6 Proz. seiner beiderseitig total Tauben keinen Nystagmus. Unter den 15 Fällen Wanners von beiderseitiger totaler Taubheit ist die

| | |
|------------------------|--------------|
| Taubheit angeboren bei | 4 = 16 Proz. |
| Erworben bei | 16 = 64 „ |
| Unsicher bei | 5 = 20 „ |
| Bei meinen 13 Fällen | |
| Taubheit angeboren bei | 1 = 7,7 „ |
| Erworben bei | 11 = 84,6 „ |
| Unsicher bei | 1 = 7,7 „ |

Schon aus diesen Zahlen geht meiner Ansicht hervor, daß die Versager bei den später Ertaubten überwiegen müssen. Insofern, als die angeborene Taubheit nur wenige Fälle von doppelseitiger Taubheit aufweist, lassen sich auch die Resultate Freys und Hammerschlags erklären.

Doppelseitig total taube Individuen unter den Taubstummen fanden:

Bezold 22 Proz., Denker 39 Proz., Haßlauer 44,9 Proz., Wanner 13,1 Proz., Frey und Hammerschlag 55,9 Proz., Brock 26,5 Proz.

Versager hatten

Bezold 28,8 Proz., Denker 41,7 Proz., Haßlauer 49,4 Proz., Wanner 34,7 Proz., Frey und Hammerschlag 45,2 Proz., Brock 31,6 Proz.

Aus dieser kleinen Tabelle ist ersichtlich, daß bei Bezold, Denker, Haßlauer, Wanner und mir die Zahl der doppelseitig total Tauben zu der Zahl der Versager in einem gewissen Verhältnis steht.

Eine Ausnahmestellung nehmen die Resultate Hugo Freys und Hammerschlags ein, bei denen die total Tauben sogar die Zahl der Versager übertreffen, während bei allen anderen Autoren gerade das Gegenteil der Fall ist.

Auffallend an den Befunden dieser beiden Autoren ist schon der hohe Prozentsatz der Total tauben und noch auffallender die große Zahl der total Tauben unter den Taubgeborenen.

Worin der Grund hierfür zu suchen ist, in einem Zufall oder in der Fragestellung, vermag ich natürlich nicht anzugeben.

Resumé.

1. Totale doppelseitige Taubheit ist in der großen Mehrzahl der Fälle postembryonal erworben.

2. Der Ausfall der Prüfung auf Nystagmus nach Rotation und nach Einspritzung verschieden temperierter Flüssigkeit in die Gehörgänge ist bei den beiderseitig total Tauben meistens negativ.

3. Für die einseitig Tauben läßt sich eine bestimmte Regel nicht aufstellen.

4. Die Gruppe VI der Besthörenden verhält sich hinsichtlich der Reaktion auf Rotation und Ausspritzung der Ohren in der überwiegenden Mehrzahl wie die Normalhörigen.

5. Die Gruppen I—V lassen sich hinsichtlich der Funktion des Bogengangapparates nicht in ein bestimmtes Schema unterbringen.

6. Meine Untersuchungen haben ergeben, daß im ganzen die Resultate des Drehversuchs übereinstimmen mit den Ergebnissen der Prüfung des kalorischen Nystagmus; es dürfte daher

7. Zur Untersuchung auf Gleichgewichtsstörungen, auf die erhaltene oder erloschene Funktion des Bogengangapparates in Zukunft genügen, die von Barany angegebene Methode der Ausspritzung der Ohren mit warmem und kaltem Wasser und die Untersuchung des hierbei auftretenden Nystagmus auszuführen; zumal diese Methode insofern genauere Resultate liefert, als man imstande ist, die Prüfung der Gleichgewichtsstörungen für jedes Ohr isoliert vorzunehmen.

8. Das Auftreten des in entgegengesetzter Richtung bemerkbaren Nystagmus nach Einspritzung von Wasser über und unter Körpertemperatur in die Gehörorgane macht es in hohem Maße wahrscheinlich, daß sowohl die Bewegung der Endolympe vom glatten Ende zur Ampulle als auch die umgekehrte Bewegungsrichtung ein reizauslösendes Moment darstellt.

Lebenslauf.

Ich, Christian Wilhelm Brock, wurde geboren zu Rappershausen (Bez.-A. Mellrichstadt) am 26. Dezember 1880 als Sohn des verstorbenen Pfarrers Christian Brock und seiner noch lebenden Ehefrau Auguste, geb. Gast.

Die Volksschule besuchte ich zu Brunn, Lateinschule und Gymnasium an den Anstalten zu Windsbach und Erlangen.

Nach Vollendung meiner Gymnasialstudien bezog ich im Wintersemester 1900 die Universität Erlangen, um mich dem Studium der Medizin zu widmen. Meine ganze Studienzeit brachte ich in Erlangen zu, woselbst ich im Sommer 1905 das medizinische Staatsexamen bestand. Da mir auf mein Gesuch hin die Ableistung des praktischen Jahres erlassen wurde, war es mir möglich, sofort in der hiesigen Univ.-Ohrenklinik (Prof. Denker) als Assistenzarzt einzutreten, in welcher Stellung ich zur Zeit noch tätig bin.

